

# Meditonsin®

## DAMLA

### Karışım

7 aydan itibaren bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde kullanmak için  
Etkin maddeler: Aconitinum D5, Atropinum sulfuricum D5 ve Mercurius cyanatus D8

**Bu ilacı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu ilacı daima bu kullanma talimatında tarif edildiği gibi ve doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarına aynen uyararak kullanınız.**

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen eczacınıza danışınız.
- Eğer yan etkiler ile karşılaşarsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Bu husus bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen yan etkiler için de geçerlidir. Bakınız Bölüm 4.
- Eğer 3 gün sonra kendinizi daha iyi hissetmezseniz ve hatta daha da kötü hissederseniz, doktorunuza başvurunuz.

### Bu kullanma talimatında:

1. Meditonsin® Damla nedir ve ne için kullanılır?
2. Meditonsin® Damla'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Meditonsin® Damla nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Meditonsin® Damla'nın saklanması
6. Ambalaj içeriği ve diğer bilgiler

### 1. Meditonsin® Damla nedir ve ne için kullanılır?

Meditonsin® Damla, soğuk algınlığı hastalıkları için homeopatik bir ilaçtır.

#### Uygulama alanı

Uygulama alanları, homeopatik ilacın profiline göre değişir.

Kapsamı: Akut boğaz, burun ve yutak bölgesi iltihapları.

Eğer 3 gün sonra kendinizi daha iyi hissetmezseniz hatta daha da kötü hissederseniz, doktorunuza başvurunuz.

### 2. Meditonsin® Damla'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

#### Aşağıdaki hallerde Meditonsin® Damla alınmamalıdır

- Aconitinum D5, Atropinum sulfuricum D5 veya Mercurius cyanatus D8'e karşı alerjiniz varsa.
- Eğer alkolikseniz (Meditonsin® damlaları hacim bazında %6 alkol içerir).

#### Uyarılar ve önlemler

Meditonsin® Damla'yı almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz.

7 aydan daha küçük bebeklerde kullanılması yönünde yeterli kaydedilmiş bilgi bulunmamaktadır. O nedenle, Meditonsin® bu hasta grubunda kullanılmamalıdır. 7-12 aylık bebeklerde Meditonsin® Damla sadece doktorla görüşülerek kullanılmalıdır.

Devam eden, belirsiz veya yeni baş gösteren şikayetlerde ya da nefes darlığı veya ateş görüldüğünde doktora başvurulmalıdır.

#### Meditonsin® Damla'nın diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

Başka ilaçlar kullanıyorsanız ya da kısa süre önce kullandıysanız ya da kullanmayı düşünüyorsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Başka maddelerle etkileşimi bilinmemektedir.

#### Meditonsin® Damla'nın besinlerle, içeceklerle ve alkolle beraber kullanılması

Homeopatik ilacın etkisi yaşam biçimindeki genel zarar verici faktörler ve uyarıcı ve keyif verici maddeler tarafından olumsuz etkilenebilir.

#### Hamilelik, emzirme ve çocuk yapma/doğurganlık

Hamileyseniz veya emziriyorsanız ya da hamile olduğunuz tahmin ediyor veya hamileliği planlıyorsanız, ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

#### Araç ve makine kullanımı

Meditonsin® Damla'nın araç ve makine kullanma kabiliyeti üzerinde etkisi yoktur.

### 3. Meditonsin® Damla nasıl kullanılır?

Bu ilacı her zaman tam olarak kullanma talimatında tarif edildiği gibi ve doktorunuz veya eczacınızla kararlaştırdığınız şekilde alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Yetişkinler, çocuklar ve 12 yaş ve üzeri gençler için geçerli kural: Akut durumlarda yetişkinler ve 12 yaş ve üzeri gençler, günde en fazla 6 defa olmak üzere, yarım veya bir saatte bir 5'er damla alırlar.

7 ay - 1 yaş arası bebekler için geçerli kural: Doktor ile görüşüldükten sonra günde en fazla 4 defa olmak üzere 1'er damla kullanılır.

1 yaş üzeri çocuklar için geçerli kural: Günde en fazla 6 defa olmak üzere 1'er damla kullanılır.

6-12 yaş arası çocuklar için geçerli kural: Günde en fazla 6 defa olmak üzere 1-2'şer damla (günde en fazla 11 damla) kullanılır.

#### Uygulama şekli

Damlalar inceltirmeden alınır ve bir süre ağızda tutulur. Kullanım öğün saatlerinden bağımsız gerçekleşir.

#### Uygulama süresi

Meditonsin® Damla mümkün olduğu kadar erken alınmalıdır.

Bir haftayı aşan kullanımlar için mutlaka önce doktora veya homeopati konusunda deneyimi olan bir terapistle danışılmalıdır. Eğer Meditonsin® Damla'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla Meditonsin® Damla kullandıysanız**

Kullanmanız gerekenden daha fazla Meditonsin® Damla kullandıysanız, içerik maddelerinden dolayı bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Bu gibi durumlarda derhal doktora başvurunuz.

#### **Meditonsin® Damla'yı kullanmayı unuttursanız**

Eğer bir önceki dozu almayı unuttursanız, çift doz almayınız, bunun yerine damla dozunu yukarıda belirtildiği gibi almayı sürdürünüz.

#### **Eğer Meditonsin® Damla'yı almayı keserseniz**

Hastalık belirtileri yeniden baş gösterebilir.

İlacın alınmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlarda olduğu gibi bu ilacın da yan etkileri olabilir, ancak bunlar her hastada görülmeyebilir.

#### **Olası yan etkiler**

Meditonsin® Damla kullanıldıktan sonra salya akması görülebilir; o zaman ilaç bırakılmalıdır.

Aşırı hassasiyet reaksiyonları görülebilir (örneğin kaşıntı ve cilt tahrişi). Bu durumda ilaç bırakılmalıdır.

Not: Homeopatik ilaçlar alınırken mevcut şikayetler geçici bir süre için artabilir (ilk kötüleşme). Bu durumda ilacı bırakmalı ve doktorunuzla görüşmelisiniz.

Eğer bahsi geçen yan etkilerden biri sizi çok olumsuz etkilerse ya da bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşarsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

#### **Yan etkilerin bildirilmesi**

Eğer yan etkiler ile karşılaşarsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Bu husus bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen yan etkiler için de geçerlidir. Yan etkileri kendiniz de doğrudan aşağıdaki kuruma bildirebilirsiniz. Yan etkileri bildirerek, ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi elde edilmesine katkı sağlarsınız.

Bundesanstalt für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3  
53175 Bonn

[www.bfarm.de/DE/Pharmakovigilanz/form/functions/formpv-node.html](http://www.bfarm.de/DE/Pharmakovigilanz/form/functions/formpv-node.html)

#### **5. Meditonsin® Damla'nın saklanması**

Meditonsin® Damla'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Etiketin ve dış ambalajın üzerinde yazan "son kullanma tarihi"nden sonra Meditonsin® Damla'yı kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

#### **Saklama koşulları**

Bu ilaç için özel saklama koşulları belirtilmemiştir.

#### **Kutu açıldıktan sonra raf ömrü**

Kutuyu açtıktan sonra Meditonsin® Damla'yı 6 aydan daha fazla kullanmayınız ve 25°C'nin üzerinde saklamayınız.

İlaçları, kanalizasyona veya ev çöpüne atmayınız. Artık kullanmadığınız ilaçların nasıl giderilmesi gerektiğini eczacınıza sorunuz. Bu sayede, çevreyi korumaya yardımcı olursunuz.

#### **6. Ambalaj içeriği ve diğer bilgiler**

##### **Meditonsin® Damla'nın içeriği:**

Etken maddeler:

10 g karışım (19 damla/g) şunları içerir:

Aconitinum Dil. D5 (HAB, T. 5a) 1 g

Atropinum sulfuricum Dil. D5 5 g

Mercurius cyanatus Dil. D8 4 g

D2'ten itibaren Aconitinum, D2'ten itibaren Atropinum sulfuricum ve D4'ten itibaren Mercurius cyanatus'un her biri %94 etanol (G/G)/ %85 gliserol/ saf su (5:10:85) karışımıyla güçlendirilmiştir

##### **Meditonsin® Damla'nın görünümü ve ambalaj içeriği:**

Berrak, renksiz karışım

Orijinal ambalaj 35 g/ 50 g/ 70 g/ 100 g (2 x 50 g) karışım içerir.

##### **Farmasötik firma ve üretici**

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn, Almanya, Telefon: 02371/937-0, Faks: 02371/937-329, [www.medice.de](http://www.medice.de), e-posta: [info@medice.de](mailto:info@medice.de)

##### **Bu kullanma talimatı en son Şubat 2016 tarihinde güncellenmiştir.**

Almanca dilindeki kullanma talimatının resmi olmayan tercümesi.

