

# Meditonsin®

## GLÓBULOS

### Gránulos

Para uso en lactantes mayores de 7 meses, niños y adultos

Ingredientes activos: Aconitinum D5, Atropinum sulfuricum D5 y Mercurius cyanatus D8

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

**Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 3 días.

### Contenido del prospecto:

1. Qué son Meditonsin® Glóbulos y para qué se utilizan
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Meditonsin® Glóbulos
3. Cómo tomar Meditonsin® Glóbulos
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Meditonsin® Glóbulos
6. Contenido del envase e información adicional

### 1. QUÉ SON MEDITONSIN® GLÓBULOS Y PARA QUÉ SE UTILIZAN

Meditonsin® Glóbulos son un medicamento homeopático para el tratamiento del resfriado.

#### Áreas de uso

Las áreas de uso se deducen de los cuadros de los medicamentos homeopáticos. A estas pertenecen: inflamación aguda de la garganta, nariz y faringe. Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 3 días.

### 2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR MEDITONSIN® GLÓBULOS

#### No tome Meditonsin® Glóbulos

- si es alérgico a Aconitinum Dil. D5, Atropinum sulfuricum Dil. D5 o Mercurius cyanatus Dil. D8.

#### Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Meditonsin® Glóbulos.

#### Información importante sobre determinados componentes de Meditonsin® Glóbulos

Este medicamento contiene sacarosa. Antes de empezar a tomar Meditonsin® Glóbulos consulte a su médico si sabe que es intolerante a ciertos tipos de azúcares.

No se dispone de suficiente experiencia documentada acerca del uso de este medicamento en lactantes menores de 7 meses. Por esta razón no se deberá administrar a este grupo de pacientes. En lactantes de 7 a 12 meses solo se deberá administrar Meditonsin® Glóbulos después de la consulta con un médico.

Consulte a su médico en caso de molestias persistentes, indefinidas o nuevas, así como en caso de problemas respiratorios o fiebre.

#### Toma de Meditonsin® Glóbulos con otros medicamentos

Comunique a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

No hay interacción conocida con otros medicamentos.

#### Toma de Meditonsin® Glóbulos con alimentos, bebidas y alcohol

El efecto de los medicamentos homeopáticos puede verse afectado negativamente por factores generalmente perjudiciales en el estilo de vida y por sustancias irritantes y estimulantes.

#### Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

#### Conducción y uso de máquinas

Meditonsin® Glóbulos no tienen ninguna influencia en la capacidad de conducir ni en el manejo de maquinaria.

### 3. CÓMO TOMAR MEDITONSIN® GLÓBULOS

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda pregunte a su médico o farmacéutico.

Para adultos y niños a partir de 12 años:

En caso de cuadros agudos, los adultos y niños a partir de 12 años deberán tomar 5 glóbulos cada media a una hora un máximo seis veces al día.

Los niños de 7 meses a 1 año deberán tomar 1 glóbulo cuatro veces al día después de consultar al médico.

Los niños a partir de un año deberán tomar 1 glóbulo como máximo 6 veces al día.

Los niños de 6 a 12 años deberán tomar entre 1 y 2 glóbulos seis veces al día (como máximo 11 glóbulos al día).

#### Vía de administración

Deje que los glóbulos se deshagan en la boca. El medicamento se puede tomar sin alimentos.

#### Duración del tratamiento

Se debe comenzar la administración de Meditonsin® Glóbulos lo antes posible.

La administración podrá ser superior a una semana sólo después de la consulta con un médico o un terapeuta con experiencia en homeopatía. Por favor informe a su médico o farmacéutico si tiene la impresión de que el efecto de Meditonsin® Glóbulos es muy fuerte o muy suave.

#### **Si toma más Meditonsin® Glóbulos del que debe**

En caso de sobredosis accidental del medicamento puede experimentar náuseas, vómitos y diarrea debido a sus componentes. En este caso acuda inmediatamente al médico.

#### **Si olvidó tomar Meditonsin® Glóbulos**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas; continúe con la administración de los glóbulos de la manera anteriormente indicada.

#### **Si interrumpe la toma de Meditonsin® Glóbulos**

Es posible que reaparezcan los síntomas. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

#### **Posibles efectos adversos**

Después del uso de Meditonsin® Glóbulos se puede manifestar exceso de salivación, si es así, suspender el medicamento.

Se pueden manifestar reacciones de hipersensibilidad (por ejemplo, picor y erupción cutánea), si es así, suspender el medicamento.

Indicación: Cuando se toman medicamentos homeopáticos se puede producir un empeoramiento transitorio de las molestias. En este caso se debe suspender el medicamento y consultar a su médico.

Por favor informe a su médico o farmacéutico si considera que alguno de los efectos adversos que experimenta es grave, o si experimenta efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

#### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

También puede comunicarlos directamente (véase abajo). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3  
53175 Bonn  
www.bfarm.de

### **5. CONSERVACIÓN DE MEDITONSIN® GLÓBULOS**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta y en la caja después de "CAD:". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

#### **Condiciones de almacenamiento**

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

#### Caducidad después de su apertura

Meditonsin® Glóbulos no se deben usar si han transcurrido más de 6 meses desde su apertura y no se deben conservar a más de 25 ° C.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

### **6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL**

#### **Composición de Meditonsin® Glóbulos:**

Los principios activos son:

10 g de glóbulos (tamaño 5) contienen:

Aconitinum Dil. D5 (HAB,V.5a, solución D2 con etanol al 86% [m/m]) 10 mg

Atropinum sulfuricum Dil. D5 50 mg

Mercurius cyanatus Dil. D8 40 mg

Aconitinum D2 y D3, Atropinum sulfuricum D2 y D3 y Mercurius cyanatus D4 hasta D6r, cada una de las sustancias potencializadas con una mezcla de etanol 94% (m/m)/ glicerol 85%/ agua purificada (5:10:85).; Aconitinum D4, Atropinum sulfuricum D4 y Mercurius cyanatus D7 potenciados con una mezcla de etanol 73% (m/m).

Otros componentes: sacarosa

#### **Aspecto de Meditonsin® Glóbulos y contenido del envase:**

Los glóbulos están contenidos en un frasco de cristal de color topacio con gotero de LDPE y tapón de rosca de PP con anillo de seguridad de HSPE.

Un paquete original contiene 8 g de Glóbulos.

#### **Titular y fabricante:**

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhlweg 37, 58638 Iserlohn, Teléfono: +492371/937-0, Fax: +492371/937-329, www.medice.de, e-mail: info@medice.de

**Este prospecto fue revisado por última vez en febrero de 2016.**

Traducción no oficial del prospecto en alemán.

