

Meditonsin®

GLÓBULOS

Gránulos

Para uso en lactantes mayores de 7 meses, niños y adultos

Ingredientes activos: Aconitinum D5, Atropinum sulfuricum D5 y Mercurius cyanatus D8

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 3 días.

Contenido del prospecto:

1. Qué son Meditonsin® Glóbulos y para qué se utilizan
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Meditonsin® Glóbulos
3. Cómo tomar Meditonsin® Glóbulos
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Meditonsin® Glóbulos
6. Contenido del envase e información adicional

1. QUÉ SON MEDITONSIN® GLÓBULOS Y PARA QUÉ SE UTILIZAN

Meditonsin® Glóbulos son un medicamento homeopático para el tratamiento del resfriado.

Áreas de uso

Las áreas de uso se deducen de los cuadros de los medicamentos homeopáticos. A estas pertenecen: inflamación aguda de la garganta, nariz y faringe. Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 3 días.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR MEDITONSIN® GLÓBULOS

No tome Meditonsin® Glóbulos

- si es alérgico a Aconitinum Dil. D5, Atropinum sulfuricum Dil. D5 o Mercurius cyanatus Dil. D8.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Meditonsin® Glóbulos.

Información importante sobre determinados componentes de Meditonsin® Glóbulos

Este medicamento contiene sacarosa. Antes de empezar a tomar Meditonsin® Glóbulos consulte a su médico si sabe que es intolerante a ciertos tipos de azúcares.

No se dispone de suficiente experiencia documentada acerca del uso de este medicamento en lactantes menores de 7 meses. Por esta razón no se deberá administrar a este grupo de pacientes. En lactantes de 7 a 12 meses solo se deberá administrar Meditonsin® Glóbulos después de la consulta con un médico.

Consulte a su médico en caso de molestias persistentes, indefinidas o nuevas, así como en caso de problemas respiratorios o fiebre.

Toma de Meditonsin® Glóbulos con otros medicamentos

Comunique a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

No hay interacción conocida con otros medicamentos.

Toma de Meditonsin® Glóbulos con alimentos, bebidas y alcohol

El efecto de los medicamentos homeopáticos puede verse afectado negativamente por factores generalmente perjudiciales en el estilo de vida y por sustancias irritantes y estimulantes.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

Meditonsin® Glóbulos no tienen ninguna influencia en la capacidad de conducir ni en el manejo de maquinaria.

3. CÓMO TOMAR MEDITONSIN® GLÓBULOS

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda pregunte a su médico o farmacéutico.

Para adultos y niños a partir de 12 años:

En caso de cuadros agudos, los adultos y niños a partir de 12 años deberán tomar 5 glóbulos cada media a una hora un máximo seis veces al día.

Los niños de 7 meses a 1 año deberán tomar 1 glóbulo cuatro veces al día después de consultar al médico.

Los niños a partir de un año deberán tomar 1 glóbulo como máximo 6 veces al día.

Los niños de 6 a 12 años deberán tomar entre 1 y 2 glóbulos seis veces al día (como máximo 11 glóbulos al día).

Vía de administración

Deje que los glóbulos se deshagan en la boca. El medicamento se puede tomar sin alimentos.

Duración del tratamiento

Se debe comenzar la administración de Meditonsin® Glóbulos lo antes posible.

La administración podrá ser superior a una semana sólo después de la consulta con un médico o un terapeuta con experiencia en homeopatía. Por favor informe a su médico o farmacéutico si tiene la impresión de que el efecto de Meditonsin® Glóbulos es muy fuerte o muy suave.

Si toma más Meditonsin® Glóbulos del que debe

En caso de sobredosis accidental del medicamento puede experimentar náuseas, vómitos y diarrea debido a sus componentes. En este caso acuda inmediatamente al médico.

Si olvidó tomar Meditonsin® Glóbulos

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas; continúe con la administración de los glóbulos de la manera anteriormente indicada.

Si interrumpe la toma de Meditonsin® Glóbulos

Es posible que reaparezcan los síntomas. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Posibles efectos adversos

Después del uso de Meditonsin® Glóbulos se puede manifestar exceso de salivación, si es así, suspender el medicamento.

Se pueden manifestar reacciones de hipersensibilidad (por ejemplo, picor y erupción cutánea), si es así, suspender el medicamento.

Indicación: Cuando se toman medicamentos homeopáticos se puede producir un empeoramiento transitorio de las molestias. En este caso se debe suspender el medicamento y consultar a su médico.

Por favor informe a su médico o farmacéutico si considera que alguno de los efectos adversos que experimenta es grave, o si experimenta efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

También puede comunicarlos directamente (véase abajo). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
53175 Bonn
www.bfarm.de

5. CONSERVACIÓN DE MEDITONSIN® GLÓBULOS

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta y en la caja después de "CAD:". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Condiciones de almacenamiento

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Caducidad después de su apertura

Meditonsin® Glóbulos no se deben usar si han transcurrido más de 6 meses desde su apertura y no se deben conservar a más de 25 ° C.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de Meditonsin® Glóbulos:

Los principios activos son:

10 g de glóbulos (tamaño 5) contienen:

Aconitinum Dil. D5 (HAB,V.5a, solución D2 con etanol al 86% [m/m]) 10 mg

Atropinum sulfuricum Dil. D5 50 mg

Mercurius cyanatus Dil. D8 40 mg

Aconitinum D2 y D3, Atropinum sulfuricum D2 y D3 y Mercurius cyanatus D4 hasta D6r, cada una de las sustancias potencializadas con una mezcla de etanol 94% (m/m)/ glicerol 85%/ agua purificada (5:10:85).; Aconitinum D4, Atropinum sulfuricum D4 y Mercurius cyanatus D7 potenciados con una mezcla de etanol 73% (m/m).

Otros componentes: sacarosa

Aspecto de Meditonsin® Glóbulos y contenido del envase:

Los glóbulos están contenidos en un frasco de cristal de color topacio con gotero de LDPE y tapón de rosca de PP con anillo de seguridad de HSPE.

Un paquete original contiene 8 g de Glóbulos.

Titular y fabricante:

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhlweg 37, 58638 Iserlohn, Teléfono: +492371/937-0, Fax: +492371/937-329, www.medice.de, e-mail: info@medice.de

Este prospecto fue revisado por última vez en febrero de 2016.

Traducción no oficial del prospecto en alemán.

