

# Медитонзин® (Meditonsin®)

## ГЛОБУЛЫ

### Глобулы

Для применения грудными детьми в возрасте старше 7 месяцев, детьми и взрослыми

Активные вещества: аконит (Aconitinum) D5/атропина сульфат (Atropinum sulfuricum ) D5/цианид ртути (Mercurius cyanatus) D8

**Перед началом приема данного лекарственного препарата внимательно прочитайте полностью листок-вкладыш, так как в нем содержится важная для Вас информация. Принимайте лекарственный препарат точно по данной инструкции или по указанию своего врача, или фармацевта.**

- Сохраните листок-вкладыш. По всей вероятности Вы захотите перечитать его и позднее.
- Обратитесь к своему фармацевту, если Вам понадобится дополнительная информация или совет.
- Если Вы замечаете побочные действия, обратитесь, пожалуйста, к своему врачу или фармацевту. Это касается также и побочных действий, не перечисленных в данном листке-вкладыше (см. п. 4).
- Если через три дня не будет улучшения или начнется ухудшение Вашего состояния, обратитесь к своему врачу.

### В данном листке-вкладыше содержится следующая информация:

1. Что такое медитонзин® глобулы, в каких случаях они применяются?
2. Что следует соблюдать до приема медитонзин® глобулы?
3. Как следует принимать медитонзин® глобулы?
4. Какие побочные действия могут наступить?
5. Как следует хранить медитонзин® глобулы?
6. Содержимое упаковки и прочая информация

### 1. ЧТО ТАКОЕ МЕДИТОНЗИН® ГЛОБУЛЫ, ИВ КАКИХ СЛУЧАЯХ ОНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ?

Медитонзин® глобулы представляют собой гомеопатический лекарственный препарат, применяемый при простудных заболеваниях.

#### Области применения

Области применения лекарственного препарата определяются проявлениями действия гомеопатического лекарственного препарата. К ним относятся: острые воспалительные заболевания полости горла, носа и глотки.

Если через три дня не будет улучшения или начнется ухудшение Вашего состояния, то обратитесь в своему врачу.

### 2. ЧТО СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ДО ПРИЕМА МЕДИТОНЗИН® ГЛОБУЛЫ?

#### Нельзя принимать медитонзин® глобулы в следующих случаях:

- при аллергической реакции на вещества аконит (Aconitinum) D5, атропина сульфат (Atropinum sulfuricum) D5 или цианид ртути (Mercurius cyanatus) D8.

#### Предупреждения и меры предосторожности

До приема медитонзин® глобулы обратитесь к своему врачу или фармацевту.

#### Важная информация об определенных ингредиентах препарата медитонзин® глобулы

Данный медикамент содержит сахарозу. Если Вы страдаете непереносимостью сахаров, принимайте медитонзин® глобулы только после консультации с лечащим врачом.

Отсутствуют достаточные документированные данные по применению данного лекарственного препарата для грудных детей в возрасте младше семи месяцев. Поэтому пациентам данной возрастной группы не рекомендуется принимать медитонзин® глобулы. Грудным детям в возрасте от 7 до 12 месяцев следует принимать медитонзин® глобулы только после консультации с врачом.

При длительных, неясных или вновь наступающих недомоганиях, а также при появлении одышки или при повышенной температуре рекомендуется обратиться к врачу.

#### Прием медитонзин® глобулы вместе с другими лекарственными препаратами:

Проинформируйте своего врача или фармацевта, если Вы принимаете/недавно принимали другие лекарственные препараты или собираетесь принимать другие лекарственные препараты.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами неизвестны.

#### Прием медитонзин® глобулы вместе с пищей, напитками и алкоголем

Общий нездоровый образ жизни и раздражающие или возбуждающие продукты могут отрицательно повлиять на действие гомеопатического средства.

#### Беременность, кормление грудью, репродуктивная способность и способность к рождению

Если Вы беременны или кормите ребенка грудью, или Вы предполагаете беременность, или собираетесь забеременеть, то перед началом приема этого лекарственного препарата посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом.

#### Вождение транспортного средства и способность обслуживать машины

Медитонзин® глобулы не оказывают никакого воздействия на способность к вождению транспортных средств или на способность к обслуживанию машин.

### 3. КАК СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ МЕДИТОНЗИН® ГЛОБУЛЫ?

Принимайте этот лекарственный препарат всегда точно в соответствии с инструкцией, содержащейся в этом листке-вкладыше, или по указанию своего врача или фармацевта. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

#### Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет:

В случае острых состояний взрослые и подростки в возрасте старше 12 лет принимают каждые полчаса/час, однако, не более 6 раз в день, по 5 глобулы.

Грудные дети в возрасте от 7 месяцев и до одного года после консультации с врачом принимают по 1 глобулы до 4 раз в день.

Дети в возрасте старше одного года принимают по 1 глобулы до 6 раз в день.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет принимают по 1-2 глобулы до 6 раз в день (максимально 11 глобулы в день).

#### Способ применения

Глобулы следует медленно рассасывать во рту до полного растворения. Прием лекарственного препарата проводится независимо от приема пищи.



#### Продолжительность приема

Рекомендуется начать принимать медитонзин® глобулы как можно скорее.

При приеме медитонзин® глобулы свыше одной недели желательно проконсультироваться с врачом или опытным врачом-гомеопатом. Если Вы считаете, что действие медитонзин® глобулы слишком сильное или слишком слабое, то, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом.

#### **Если Вы приняли большую дозу медитонзин глобулы, чем предписано**

Если Вы по ошибке приняли большую дозу лекарственного препарата, то в этом случае могут возникнуть тошнота, рвота и понос, что обусловлено ингредиентами препарата. В таких случаях немедленно обратитесь к врачу.

#### **Если Вы забыли принять медитонзин глобулы**

Если Вы забыли принять лекарственный препарат, то не принимайте двойную дозу, а продолжите лечение, принимая рекомендованную дозу.

#### **Если Вы прервали прием медитонзин глобулы**

В этом случае симптомы могут снова появиться.

Если по приему лекарственного препарата возникнут дополнительные вопросы, обратитесь, пожалуйста, к своему врачу или фармацевту.

#### **4. КАКИЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ НАСТУПИТЬ?**

Как и все лекарственные препараты, также и этот лекарственный препарат может вызвать побочные действия, которые, однако, необязательно наступают у каждого пациента.

#### **Возможные побочные действия**

После приема медитонзин® глобулы может возникнуть повышенное слюноотечение; в таких случаях прием лекарственного препарата должен быть прекращен.

Возможны реакции гиперчувствительности (например, зуд или сыпь). В этом случае следует прекратить прием лекарственного препарата.

Примечание: При приеме гомеопатических лекарственных препаратов имеющиеся симптомы в начальной стадии могут усилиться (первичное ухудшение). В таком случае Вы должны прекратить прием лекарства и посоветоваться со своим врачом.

Если одно из указанных побочных действий отрицательно воздействует на Ваше самочувствие или Вы замечаете побочные действия, не указанные в данном листке-вкладыше, то проинформируйте, пожалуйста, об этом своего врача или фармацевта.

#### **Сообщение о побочных действиях**

Если Вы замечаете побочные действия, то обратитесь к своему врачу или фармацевту. Это касается также и побочных действий, не указанных в данном листке-вкладыше.

Вы можете также сообщить о побочных действиях прямо в Федеральный институт лекарственных препаратов и медицинских продуктов по адресу:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3  
53175 Bonn  
Германия  
Веб-сайт: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

Тем самым Вы можете способствовать получению наиболее полной информации с целью более безопасного применения этого лекарственного препарата.

#### **5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ МЕДИТОНЗИН® ГЛОБУЛЫ?**

Храните этот лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Нельзя применять этот лекарственный препарат после окончания срока годности, указанного на этикетке и на картонной коробке «Срок годности до:». Датой конечного срока годности считается последний день указанного месяца.

#### **Условия хранения**

Для данного лекарственного препарата не предусмотрены особые условия хранения.

#### **Срок хранения после вскрытия упаковки**

После вскрытия упаковки медитонзин® глобулы можно применять не более 6 месяцев и следует хранить при температуре не выше 25 °C.

Не выливайте лекарственный препарат в канализацию и не выбрасывайте его вместе с бытовым мусором. Спросите у своего фармацевта, как правильно утилизировать не нужный Вам лекарственный препарат. Тем самым Вы вносите положительный вклад в защиту окружающей среды.

#### **6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

##### **Состав медитонзин® глобулы:**

Активные вещества:

10 г глобулы (размер 5) содержат:

аконит в гомеопатическом разбавлении D5 (Aconitinum Dil. D5) (HAB, V. 5a) Раствор D2 в этаноле 86% (м/м)] (10 мг)

атропина сульфат в гомеопатическом разбавлении D5 (Atropinum sulfuricum Dil. D5) (50 мг)

цианид ртути в гомеопатическом разбавлении D8 (Mercurius cyanatus Dil. D8) (40 мг)

аконит (Aconitinum) D2 и D3; атропина сульфат (Atropinum sulfuricum) D2 и D3и цианид ртути (Mercurius cyanatus) D5-D6 потенцируются

соответственно со смесью из 94%-го этанола (м/м)/ глицерина 85 %/и очищенной воды (5:10:85);

аконит (Aconitinum) D4; атропина сульфат (Atropinum sulfuricum) D4 и цианид ртути (Mercurius cyanatus) D7 потенцируются соответственно с 73%-м этанолом (м/м)

Прочие ингредиенты: сахароза

##### **Внешний вид медитонзин® глобулы и содержимое упаковки:**

Глобулы упакованы в бутылочку из коричневого стекла с полиэтиленовой насадкой, завинчивающейся крышкой из полипропилена и полиэтиленовым защитным кольцом. Одна фирменная упаковка содержит 8 г глобулы

##### **Производитель и со-дистрибьютор**

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn (г. Изерлон), телефон: 02371/937-0, телефакс: 02371/937-329, [www.medice.de](http://www.medice.de), e-mail: [info@medice.de](mailto:info@medice.de)

**Данная Инструкция по применению последний раз была переработана в феврале 2016 года.**

Неофициальный перевод немецкого листка-вкладыша.

