

Meditonsin®

GLOBALI

Sferule

Per l'uso nei neonati di età superiore ai 7 mesi, bambini e adulti

Principi attivi: Aconitina D5/ Atropina Solfato D5/ Cianato di Mercurio D8

Leggere con attenzione tutto il foglietto illustrativo, prima di iniziare l'assunzione del medicinale in quanto contiene informazioni importanti.

Assumere questo medicinale sempre esattamente come descritto nel foglietto illustrativo o esattamente secondo le indicazioni del Suo medico o farmacista.

- Conservare il foglietto illustrativo. Potrebbe aver bisogno di rileggerlo in seguito.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli si rivolga al farmacista.
- Se nota degli effetti collaterali si rivolga al Suo medico o farmacista. Questo vale anche per gli effetti collaterali non indicati in questo foglietto illustrativo. Vedi paragrafo 4.
- Se dopo 3 giorni non si sente meglio o addirittura i sintomi peggiorano, si rivolga al Suo medico.

Cos'è indicato in questo foglietto illustrativo:

1. Cosa sono Meditonsin® Globuli e quando utilizzarli?
2. Cosa deve tenere presente prima di assumere Meditonsin® Globuli?
3. Come assumere Meditonsin® Globuli?
4. Quali effetti collaterali può provocare?
5. Come conservare Meditonsin® Globuli?
6. Contenuto della confezione e ulteriori informazioni

1. COS'È MEDITONSIN® GLOBULI E QUANDO UTILIZZARLO?

Meditonsin® Globuli è un medicinale omeopatico per il trattamento delle malattie da raffreddamento.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione risulta dalle indicazioni generali dei prodotti omeopatici. È indicato per il trattamento di infiammazioni acute della gola e del rinofaringe.

Se dopo 3 giorni non si sente meglio o addirittura i sintomi peggiorano, si rivolga al Suo medico.

2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI ASSUMERE MEDITONSIN® GLOBULI?

Non assumere Meditonsin® Globuli nei seguenti casi

- allergia ad Aconitina D5, Atropina Solfato D5, Cianato di Mercurio D8

Avvertenze e precauzioni d'uso

Consulti il Suo medico o farmacista prima di assumere Meditonsin® Globuli

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Meditonsin® Globuli

Questo medicinale contiene saccarosio. Se sa di avere un'intolleranza a determinati zuccheri, contatti il medico prima di assumere Meditonsin® Globuli.

Per l'uso di questo medicinale nei neonati di età inferiore ai 7 mesi non vi sono sufficienti esperienze documentate. Per tale motivo non somministrarlo a questo gruppo di pazienti. Somministrare Meditonsin® Globuli ai neonati fra i 7 e i 12 mesi solamente dopo aver consultato il medico.

Consultare il medico se i sintomi persistono, non sono chiari oppure se ci sono dei sintomi nuovi oltre a dispnea o febbre.

Se assume Meditonsin® Globuli con altri medicinali:

Se assume altri medicinali o li ha assunti da poco o intende assumerli informi il suo medico o farmacista.

Non si è a conoscenza di interazioni con altre sostanze.

Assunzione di Meditonsin® Globuli con alimenti, bevande analcoliche e alcoliche

L'efficacia dei medicinali omeopatici può essere influenzata negativamente da fattori generalmente dannosi nello stile di vita e da sostanze stimolanti e voluttuarie.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è incinta o sospetta di esserlo oppure sta pianificando una gravidanza o sta allattando consulti il Suo medico prima dell'assunzione.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Meditonsin® Globuli non altera la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

3. COME ASSUMERE MEDITONSIN® GLOBULI?

Assumere questo medicinale sempre nel modo descritto nel presente foglietto illustrativo oppure secondo quanto stabilito insieme al Suo medico o farmacista. Se ha dei dubbi consulti il suo medico o farmacista.

Per gli adulti e i giovani di età superiore ai 12 anni vale quanto segue:

Per il trattamento di sintomi acuti gli adulti e i giovani di età superiore ai 12 anni assumono ogni mezzora o ogni ora, al massimo 6 volte al dì rispettivamente 5 globuli.

Per i neonati dal 7° mese di età fino al compimento di 1 anno vale quanto segue: dopo aver consultato il medico rispettivamente 1 globulo 4 volte al dì. I bambini dopo aver compiuto il primo anno di età rispettivamente 1 globulo fino a 6 volte al dì.

I bambini dai 6 ai 12 anni assumono fino a 6 volte al dì da 1 a 2 globuli (al massimo 11 globuli al giorno).

Modalità d'uso

Lasciar sciogliere i globuli in bocca. I globuli possono essere assunti indipendentemente dai pasti.

Durata della somministrazione

Iniziare ad assumere Meditonsin® Globuli possibilmente già ai primi sintomi.

Assumere per più di una settimana solamente previa consultazione con un medico o un terapeuta con esperienza nel campo dell'omeopatia. Consulti il medico o il farmacista se ha l'impressione che l'effetto di Meditonsin® Globuli sia troppo forte o troppo debole.

Se ha assunto una dose superiore a quanto indicato di Meditonsin® Globuli

In caso di iperdosaggio inavvertito del medicinale a causa degli ingredienti possono verificarsi nausea, vomito ed diarrea. In questi casi consultare tempestivamente un medico.

Se ha dimenticato di assumere Meditonsin® Globuli

Non assuma la quantità doppia se ha dimenticato la dose precedente, ma continui ad assumere il medicinale come sopra indicato.

Se interrompe l'assunzione di Meditonsin® Globuli

Con molta probabilità si ripresenteranno i sintomi.

Se ha ulteriori domande sull'assunzione del medicinale si rivolga al suo medico o farmacista.

4. QUALI EFFETTI COLLATERALI POTREBBERO VERIFICARSI?

Come tutti i medicinali anche questo medicinale può avere degli effetti collaterali che però non devono necessariamente verificarsi in tutti.

Possibili effetti collaterali

Dopo l'uso di Meditonsin® Globuli può verificarsi una ipersecrezione salivare, in tal caso interrompere l'assunzione.

Possono verificarsi casi di ipersensibilità (p.e. prurito ed eruzioni cutanee), in tal caso interrompere l'assunzione del medicinale.

Avvertenza:

L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a un'atemporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale). In tal caso interrompere l'assunzione e consultare il medico.

Informi per favore il suo medico o farmacista se uno degli effetti collaterali indicati dovessero nuocerle notevolmente o se osserva effetti collaterali che non sono indicati nel presente foglietto illustrativo.

Comunicazione degli effetti collaterali

Se nota degli effetti collaterali si rivolga al suo medico o farmacista. Questo vale anche per gli effetti collaterali non indicati in questo foglietto illustrativo. Può comunicare gli effetti collaterali anche direttamente al

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Istituto Federale per Medicinali e prodotti medicinali)

Abt. Pharmakovigilanz (reparto di farmacovigilanza)

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3

53175 Bonn

Sito web: www.bfarm.de

Comunicando gli effetti collaterali contribuisce a far sì che siano disponibili più informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. COME CONSERVARE MEDITONSIN® GLOBULI?

Tenere i medicinali lontani dalla portata dei bambini.

Non usare più questo medicinale dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta e sulla scatola dopo "consumare entro il". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese indicato.

Condizioni di conservazione

Questo medicinale non ha bisogno di essere conservato in condizioni particolari.

Periodo di validità dopo la prima apertura

Dopo l'apertura non usare Meditonsin® Globuli per più di 6 mesi e non conservare a temperature superiori a 25 °C.

Non smaltire questo medicinale nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come smaltirlo quando non lo utilizza più. In questo modo contribuisce alla tutela dell'ambiente.

6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI

Cosa contiene Meditonsin® Globuli:

I principi attivi sono:

In 10 globuli (numero 5) sono contenuti:

Aconitina Dil. D5 [(HAB, norma 5a, soluzione D2 con etanolo 86% (m/m)]

10 mg

Atropina Solfato Dil. D5

50 mg

Cianato di Mercurio Dil. D8

40 mg

Aconitina D2 e D3, Atropina Solfato D2 e D3 e Cianato di Mercurio da D4 a D6 rispettivamente potenziati con una miscela di etanolo 94% (m/m)/ glicerolo 85%/ acqua distillata (5:10:85); Aconitina D4, Atropina Solfato D4 e Cianato di Mercurio D7 rispettivamente potenziati con etanolo 73% (m/m).

Eccipiente: saccarosio

Aspetto di Meditonsin® Globuli e contenuto della confezione:

Un flacone in vetro marrone con contagocce in LDPE e tappo a vite in PP con anello antimanomissione in HDPE contenente sferule (globuli).

Una confezione originale contiene 8 g di globuli

Azienda farmaceutica e produttore

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn,

Telefono: 02371/937-0, Telefax: 02371/937-329, www.medice.de, e-mail: info@medice.de

Questo foglietto illustrativo è stato aggiornato nel febbraio 2016.

