

Meditonsin®

GLOBULI

Globuli (kürecik)

7 aydan itibaren bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde kullanmak için

Etkin maddeler: Aconitinum D5, Atropinum sulfuricum D5 ve Mercurius cyanatus D8

Bu ilacı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu ilacı daima bu kullanma talimatında tarif edildiği gibi ve doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarına aynen uyarak kullanınız.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen eczacınıza danışınız.
- Eğer yan etkiler ile karşılaşırsanız, doktorunuza veya eczacınıza bildirin. Bu husus bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen yan etkiler için de geçerlidir. Bakınız Bölüm 4.
- Eğer 3 gün sonra kendinizi daha iyi hissetmezseniz ve hatta daha da kötü hissederseniz, doktorunuza başvurunuz.

Bu kullanma talimatında:

1. Meditonsin® Globuli nedir ve ne için kullanılır?
2. Meditonsin® Globuli'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Meditonsin® Globuli nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Meditonsin® Globuli'nin saklanması
6. Ambalaj içeriği ve diğer bilgiler

1. Meditonsin® Globuli nedir ve ne için kullanılır?

Meditonsin® Globuli, soğuk algınlığı hastalıkları için homeopatik bir ilaçtır.

Uygulama alanı

Uygulama alanları, homeopatik ilacın profiline göre değişir. Kapsamı:

Akut boğaz, burun ve yutak bölgesi iltihapları.

Eğer 3 gün sonra kendinizi daha iyi hissetmezseniz hatta daha da kötü hissederseniz, doktorunuza başvurunuz.

2. Meditonsin® Globuli'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Aşağıdaki hallerde Meditonsin® Globuli alınmamalıdır

- Aconitinum D5, Atropinum sulfuricum D5 veya Mercurius cyanatus D8'e karşı alerjiniz varsa.

Uyarılar ve önlemler

Meditonsin® Globuli'yi almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Meditonsin® Globuli'nin diğer bazı bileşenleriyle ilgili önemli bilgiler

Bu ilaç şeker içerir. Eğer belli şekere karşı toleranssız olduğunuzu biliyorsanız, Meditonsin® Globuli'yi almadan önce doktorunuza danışınız.

7 aydan daha küçük bebeklerde kullanılması yönünde yeterli kaydedilmiş bilgi bulunmamaktadır. O nedenle, Meditonsin® bu hasta grubunda kullanılmamalıdır.

7-12 aylık bebeklerde Meditonsin® Globuli sadece doktorla görüşülerek kullanılmalıdır.

Devam eden, belirsiz veya yeni baş gösteren şikayetlerde ya da nefes darlığı veya ateş görüldüğünde doktora başvurulmalıdır.

Meditonsin® Globuli'nin diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

Başka ilaçlar kullanıyorsanız ya da kısa süre önce kullandıysanız ya da kullanmayı düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza bildirin. Başka maddelerle etkileşimi bilinmemektedir.

Meditonsin® Globuli'nin besinlerle, içeceklerle ve alkolle beraber kullanılması

Hamileyseniz veya emziriyorsanız ya da hamile olduğunuz tahmin ediyor veya hamileliği planlıyorsanız, ilacı almadan önce doktorunuza sorunuz.

Hamilelik, emzirme ve çocuk yapma/doğurganlık

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Araç ve makine kullanımı

Meditonsin® Globuli'nin araç ve makine kullanma kabiliyeti üzerinde etkisi yoktur.

3. Meditonsin® Globuli nasıl kullanılır?

Bu ilacı her zaman tam olarak kullanma talimatında tarif edildiği gibi ve doktorunuz veya eczacınızla kararlaştırdığınız şekilde alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Yetişkinler, çocuklar ve 12 yaş ve üzeri gençler için geçerli kural:

Akut durumlarda yetişkinler ve 12 yaş ve üzeri gençler, günde en fazla 6 defa olmak üzere, yarım veya bir saatte bir 5'er kürecik alırlar.

7 ay - 1 yaş arası bebekler için geçerli kural: Doktor ile görüşüldükten sonra günde en fazla 4 defa olmak üzere 1'er kürecik kullanılır.

1 yaş üzeri çocuklar için geçerli kural: Günde en fazla 6 defa olmak üzere 1'er kürecik kullanılır.

6-12 yaş arası çocuklar için geçerli kural: Günde en fazla 6 defa olmak üzere 1-2'şer kürecik (günde en fazla 11 kürecik) kullanılır.

Uygulama şekli

Kürecikleri ağzınızda eritin. Kullanım öğün saatlerinden bağımsız gerçekleşebilir.

Uygulama süresi

Meditonsin® Globuli mümkün olduğu kadar erken alınmalıdır.

Bir haftayı aşan kullanımlar için mutlaka önce doktora veya homeopati konusunda deneyimi olan bir terapistle danışılmalıdır. Eğer Meditonsin® Globuli'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Meditonsin® Globuli kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla Meditonsin® Globuli kullandıysanız, içerik maddelerinden dolayı bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Bu gibi durumlarda derhal doktora başvurunuz.

Meditonsin® Globuli'yi kullanmayı unutursanız

Eğer bir önceki dozu almayı unuttursanız, çift doz almayınız, bunun yerine globuli dozunu yukarıda belirtildiği gibi almayı sürdürünüz.

Eğer Meditonsin® Globuli'yi almayı keserseniz

Hastalık belirtileri yeniden baş gösterebilir.

İlacın alınmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi bu ilacın da yan etkileri olabilir, ancak bunlar her hastada görülmeyebilir.

Olası yan etkiler

Meditonsin® Globuli kullanıldıktan sonra salya akması görülebilir; o zaman ilaç bırakılmalıdır.

Aşırı hassasiyet reaksiyonları görülebilir (örneğin kaşıntı ve cilt tahrişi). Bu durumda ilaç bırakılmalıdır.

Not: Homeopatik ilaçlar alınırken mevcut şikayetler geçici bir süre için artabilir (ilk kötüleşme). Bu durumda ilacı bırakmalı ve doktorunuzla görüşmelisiniz.

Eğer bahsi geçen yan etkilerden biri sizi çok olumsuz etkilerse ya da bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin bildirilmesi

Eğer yan etkiler ile karşılaşsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Bu husus bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen yan etkiler için de geçerlidir. Yan etkileri kendiniz de doğrudan aşağıdaki kuruma bildirebilirsiniz. Yan etkileri bildirerek, ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi elde edilmesine katkı sağlarsınız.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
53175 Bonn
İnternet adresi: www.bfarm.de

5. Meditonsin® Globuli'nin saklanması

Meditonsin® Globuli'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Etiketin ve dış ambalajın üzerinde yazan "son kullanma tarihi"nden sonra Meditonsin® Globuli'yi kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

Saklama koşulları

Bu ilaç için özel saklama koşulları belirtilmemiştir.

Kutu açıldıktan sonra raf ömrü

Kutuyu açtıktan sonra Meditonsin® Globuli'yi 6 aydan daha fazla kullanmayınız ve 25°C'nin üzerinde saklamayınız.

İlaçları, kanalizasyona veya ev çöpüne atmayınız. Artık kullanmadığınız ilaçların nasıl giderilmesi gerektiğini eczacınıza sorunuz. Bu sayede, çevreyi korumaya yardımcı olursunuz.

6. Ambalaj içeriği ve diğer bilgiler

Meditonsin® Globuli'nin içeriği:

Etkin maddeler:

10 g küreciğe (ebat 5) şu maddeler işlenmiştir:

Aconitinum Dil. D5 [HAB, tertip 5a, %86 etanol esaslı D2 çözelti (m/m)] 10 mg

Atropinum sulfuricum Dil. D5 50 mg

Mercurius cyanatus Dil. D8 40 mg

Aconitinum D2 ve D3, Atropinum sulfuricum D2 ve D3 ve Mercurius cyanatus D4 ilâ D6'nin her biri %94 etanol (m/m)/ %85 gliserol/ saf su (5:10:85) karışımıyla güçlendirilmiştir; Aconitinum D4, Atropinum sulfuricum D4 ve Mercurius cyanatus D7'nin her biri %73 etanol (m/m) ile güçlendirilmiştir.

Diğer bileşeni: sükröz

Meditonsin® Globulinin görünümü ve ambalaj içeriği:

Kürecikler (globuli) LDPE damlalıklı ve HDPE orijinalite halkasına sahip PP yivli kapaklı kahverengi bir şişede ambalajlanmıştır.

1 orijinal ambalaj 8 g globuli içerir.

Farmasötik firma ve üretici

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn, Almanya, Telefon: 02371/937-0, Faks: 02371/937-329, www.medic.de, e-posta info@medice.de

Bu kullanma talimatı en son Şubat 2016 tarihinde güncellenmiştir.

Almanca dilindeki kullanma talimatının resmi olmayan tercümesi.

