

Traduction inofficielle de la notice allemande

Libellé des informations prévues pour la notice

Mode d'emploi: information de l'utilisateur

exoderil Crème 10 mg

Chlorhydrate de naftifine

exoderil[®] Crème 10 mg

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4
- Vous devez vous adresser à votre médecin si, après 7 jours, vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que exoderil Crème et quand doit-il être utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser exoderil Crème?
3. Comment utiliser exoderil Crème?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver exoderil Crème?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE EXODERIL CREME ET QUAND DOIT-IL ETRE UTILISE?

exoderil Crème est un médicament contre les mycoses (antimycosiques).

Indications thérapeutiques

Traitement des mycoses de la peau (dermatomycoses) provoquées par des dermatophytes, des levures et des moisissures, ainsi que des infections mixtes avec des bactéries.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER EXODERIL CREME?

exoderil Crème ne doit pas être appliqué:

- si vous êtes allergique au chlorhydrate de naftifine ou à l'un des autres composants contenus dans exoderil Crème mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser exoderil Crème.

En cas d'hypersensibilité connue à l'alcool cétylique ou à l'alcool stéarylique, il est recommandé de remplacer exoderil Crème par une forme d'administration sans propylène glycol (exoderil Gel).

exoderil Crème ne doit pas entrer dans les yeux.

Autres médicaments et exoderil Crème:

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé, ou pourriez utiliser tout autre médicament.

On ne connaît à ce jour pas d'interactions lors de l'application d'exoderil Crème.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Lors d'une application cutanée conforme aux instructions de dosage, la substance active naftifine n'est absorbée qu'en très petite quantité dans l'organisme; c'est pourquoi un effet systémique (effet sur d'autres organes) n'est pas à craindre. Mais pendant la grossesse et l'allaitement, exoderil Crème ne devrait être appliqué qu'après une évaluation minutieuse du rapport bénéfices/risques.

exoderil Crème contient de l'alcool cétylique et de l'alcool stéarylique

L'alcool cétylique et l'alcool stéarylique peuvent provoquer des irritations cutanées localisées (p. ex. dermatite de contact).

3. COMMENT UTILISER EXODERIL CREME?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

exoderil Crème est appliqué en couche mince une fois par jour, de préférence le soir, sur les zones de peau atteintes puis frictionné.

Normalement, les symptômes, p. ex. démangeaisons, s'améliorent en quelques jours. Mais vous devez impérativement poursuivre le traitement pendant encore 1 à 2 semaines après la disparition de tous les symptômes de la maladie. Sinon la mycose risque de réapparaître après une courte période.

Globalement, la durée du traitement dépend de l'agent responsable de la maladie, de son étendue et des zones corporelles atteintes.

Si vous avez utilisé plus de exoderil Crème que vous n'auriez dû

En cas de surdosage, veuillez consulter votre médecin si des symptômes apparaissent.

Si vous avez oublié d'utiliser exoderil Crème

Si vous avez oublié l'application précédente, n'utilisez pas de dose double.

Si vous arrêtez d'utiliser exoderil Crème

Si le traitement n'est pas appliqué pendant une durée suffisante, la mycose peut à nouveau se propager ou réapparaître.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Très rare: (survenant chez moins de 1 patient traité sur 10 000)

Hypersensibilité, ainsi que irritations locales, sensations de brûlures ou sécheresse cutanée, généralement temporaires

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement par le système de déclaration du Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt.

Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D53175 Bonn, site web:

<http://www.bfarm.de>. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER EXODERIL CREME?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le tube et l'emballage après la mention «EXP». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conditions de conservation:

Aucune condition de conservation particulière n'est nécessaire pour ce médicament.

Indication sur la conservation après ouverture

La crème peut être utilisée pendant encore 8 semaines après ouverture du tube.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.
Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus.
Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que exoderil Crème contient

La substance active est chlorhydrate de naftifine.

1 g de crème contient:

10 mg de chlorhydrate de naftifine

Les autres composants sont: hydroxyde de sodium, alcool benzylique, stéarate de sorbitane, palmitate de cétyle (Ph. Eur.), alcool cétylique (Ph. Eur.), alcool stéarylique (Ph. Eur.), polysorbate 60, myristate d'isopropyle (Ph. Eur.); eau purifiée.

Comment se présente exoderil Crème et contenu de l'emballage extérieur

Crème blanche, brillante.

Tubes de 20 g ou de 50 g de crème

Entreprise pharmaceutique et fabricant

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37

58638 Iserlohn

téléphone: +49 2371/937-0

fax: +49 2371/937-106

www.medice.de

e-mail: info@medice.de

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est juillet 2013.