

Almanca dilindeki kullanma talimatının resmi olmayan tercümesi

Ambalaj prospektüsü için öngörölmüş bilgi metni

Kullanma Talimatı: Kullanıcı için bilgiler

exoderil Gel 10 mg jel

Naftifin hidroklorür

exoderil® Gel 10 mg

Bu ilacı uygulamaya başlamadan önce ambalaj prospektüsünün tümünü dikkatlice okuyunuz, çünkü önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı her zaman kesinlikle ambalaj prospektüsünde belirtildiği gibi veya doktorunuzun veya eczacınızın talimatları doğrultusunda uygulayınız.

- Ambalaj prospektüsünü saklayınız. Belki onu daha sonra tekrar okumak isteyebilirsiniz.
- Daha fazla bilgiye veya bir tavsiyeye ihtiyacınız olursa, eczacınıza sorunuz.
- Eğer yan etkiler fark ederseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu husus, bu ambalaj prospektüsünde belirtilmeyen yan etkiler için de geçerlidir. Bakınız Bölüm 4.
- Yedi gün sonra kendinizi daha iyi hissetmezseniz ve hatta daha kötü hissedecek olursanız, doktorunuza danışınız.

Bu ambalaj prospektüsünün içeriği

1. exoderil Gel nedir ve ne için kullanılır?
2. exoderil Geli kullanmadan önce nelere dikkat etmelisiniz?
3. exoderil Gel nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkileri nelerdir?
5. exoderil Gel nasıl saklanır?
6. Ambalaj içeriği ve diğer bilgiler

1. EXODERİL GEL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

exoderil jel mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan bir ilaçtır (antimikotik).

Uygulama alanları

Dermatofitlerin, maya ve küf mantarlarının ve bakterilerle karma enfeksiyonların deride yol açtığı mantar enfeksiyonları (dermatomikozlar).

Tırnaklarda oluşan mantar enfeksiyonlarında (onikomikoz) bir tedavi denemesi önerilir.

2. EXODERİL GEL'İ KULLANMADAN ÖNCE NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

exoderil Gel aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

- Naftifin hidroklorüre veya ilacın Bölüm 6'da sözü geçen diğer bileşenlerinden birine karşı alerjiniz olması durumunda.

Uyarı ve önlemler

Lütfen exoderil Gel'i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Propilen glikole karşı bilinen aşırı hassasiyet olması durumunda exoderil Gel yerine propilen glikol içermeyen başka bir uygulama şekli (exoderil Creme kremi) önerilir.

exoderil Gel alkol içerdiğinden gözlerle temas etmemeli ve mukoza zarları üzerine uygulanmamalıdır. exoderil Gel açık yaralara da sürülmemelidir.

exoderil Gel'in diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer başka ilaçlar uyguluyorsanız, ya da kısa bir süre önce başka ilaçlar uyguladıysanız, ya da başka ilaçlar uygulamak niyetindeyseniz, lütfen doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Şu ana kadar exoderil Gel'in bilinen herhangi bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Gebelik ve emzirme dönemi

Eğer hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız, ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kremin cilde dozaj talimatında belirtildiği şekilde uygulanması durumunda vücut tarafından emilen naftifin etken maddesinin miktarı çok azdır, bu nedenle sistemik bir etki (diğer organların etkilenmesi) söz konusu değildir. Ancak exoderil Gel gebelik ve emzirme döneminde yine de fayda-zarar dengesi göz önünde tutularak kullanılmalıdır.

exoderil Gel propilen glikol içerir

Propilen glikol cildi tahriş edebilir.

3. EXODERİL GEL NASIL KULLANILIR?

Bu ilacı daima kesinlikle doktorunuzla veya eczacınızla kararlaştırdığınız şekilde uygulayınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

exoderil Gel günde bir kez, tercihen akşamları, cildin etkilenen yerlerine ince bir tabaka halinde ovuşturularak sürülür. Tırnaklarda oluşan mantar enfeksiyonlarında tedavinin günde iki kez (sabah ve akşam) uygulanması önerilir.

Normalde şikayetler, örn. kaşıntı, bir kaç gün içinde yok olur. Ancak lütfen tedaviyi hastalığın tüm belirtileri yok olduktan sonra da mutlaka 1-2 hafta daha sürdürünüz. Aksi durumda kısa bir süre sonra mantar hastalığının tekrar baş göstermesi tehlikesi mevcuttur.

Tırnaklarda görülen mantar hastalıkları normalde daha uzun süreli tedavi gerektirir. Ancak uygulama süresi 6 ayı geçmemelidir. Toplam tedavi süresi hastalığa neden olan mikrop türüne, hastalığın boyutuna ve vücudun hangi bölgesinin etkilendiğine bağlıdır.

Uygulamanız gerekenden daha fazla miktarda exoderil Gel uyguladıysanız
Doz aşımı durumunda ortaya çıkabilecek şikayetlerle ilgili olarak doktorunuza başvurunuz.

exoderil Gel'i uygulamayı unuttuysanız

Bir önceki dozu uygulamayı unuttuysanız, çift doz uygulamaktan kaçınınız.

exoderil Gel'i uygulamayı keserseniz

Tedavinin yeterince uzun sürdürülmemesi durumunda mantar enfeksiyonu tekrar yayılabilir veya yineleyebilir.

Bu ilacın kullanımına yönelik başka sorularınız olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi bu ilacın da yan etkileri olabilir, ancak bunların herkeste ortaya çıkması şart değildir.

Çok nadir (tedavi edilen her 10.000 kişide birden az)

Aşırı hassasiyet ve, çoğu zaman geçici olmak koşuluyla, ciltte bölgesel tahrişler, yanma veya kuruma

1. Yan etkilerin bildirilmesi
2. Eğer yan etkiler fark ederseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu husus, bu ambalaj prospektüsünde belirtilmeyen yan etkiler için de geçerlidir. Yan etkileri doğrudan Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn adresinde bulunan Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü), Pharmakovigilanz (farmakovijilans) bölümüne de bildirebilirsiniz. Web sitesi: <http://www.bfarm.de>. Yan etkileri bildirerek bu ilacın güvenliğiyle ilgili daha fazla bilgi elde edilmesine katkı sağlamış olursunuz.

5. EXODERİL GEL NASIL SAKLANIR?

Bu ilacı çocukların görmeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

Bu ilacı tütün ve dış ambalajının üzerinde belirtilmiş olan "Son kullanma tarihinden" sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününe denk gelir.

25°C'nin üzerinde ve 2°C'nin altında saklamayınız.

Tüp açıldıktan sonra dayanma süresi

Jel tüp açıldıktan sonra 8 hafta daha kullanılabilir.

İlacı kanalizasyona veya ev çöpüne atarak gidermeyiniz. İlacı ihtiyacınız kalmadığında nasıl gidereceğinizi öğrenmek için eczacınıza danışınız. Böylece çevrenin korunmasına katkıda bulunmuş olursunuz.

6. AMBALAJ İÇERİĞİ VE DİĞER BİLGİLER

exoderil Gel'in içeriği

Etken maddesi naftifin hidroklorürdür.

1 g jel:

10 mg naftifin hidroklorür içerir

Yardımcı maddeler şunlardır: Sodyum edetat (Ph. Eur.); karbomer 104; trometamol; polisorbat 80; 2-propanol (Ph. Eur.); propilen glikol; saflaştırılmış su

exoderil Gel'in görünüşü ve ambalajın içeriği

Şeffaf, renksiz ilâ sarımtırak jel

20 g ve 50 g jel içeren tüpler

Farmasötik firma ve üretici

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37

58638 Iserlohn, Almanya

Telefon: +49 2371/937-0

Faks: +49 2371/937-106

www.medice.de

E-posta: info@medice.de

Bu kullanım bilgileri son olarak Temmuz 2013 tarihinde düzenlenmiştir.