

هذه ليست الترجمة الرسمية للنشرة الألمانية المرفقة بالعبوة

معلومات الاستخدام: معلومات للمستخدم

مديولاكس® مديكي أقراص مثبطة لأفرازات المعدة 10 ملغم
المادة الفعالة: بيساكوديل
للاستخدام لدى البالغين والأطفال ابتداء من عمر 10 أعوام.

قبل البدء في تناول هذا العقار يرجى قراءة سائر النشرة المرفقة بالعبوة بعناية، لأنها تتضمن معلومات هامة.
تناول هذا العقار الدوائي دائماً بدقة كما هو موصوف في النشرة المرفقة أو تبعاً لتعليمات الطبيب أو الصيدلي.

- الرجاء الاحتفاظ بنشرة العبوة. ربما ترغب في قراءتها مرة أخرى في وقت لاحق.
- قم بالاستفسار لدى الصيدلي، إذا كنت تحتاج إلى معلومات أخرى أو لنصيحة.
- إذا لاحظت أعراض جانبية، فيرجى التوجه إلى طبيبك أو الصيدلي. يسري هذا أيضاً على الأعراض الجانبية الغير مذكورة في نشرة العبوة هذه. أنظر فقرة 4.
- إذا لم تتحسن الأعراض أو أحسست بسوء حالتك يرجى التوجه إلى طبيبك.

ماذا يوجد في هذه النشرة:

1. ما هو مديولاكس® مديكي ولماذا يتم استخدامه؟
2. مالذي ينبغي عليك مراعاته قبل تناول مديولاكس® مديكي ؟
3. كيف يتم تناول مديولاكس® مديكي ؟
4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟
5. كيف يتم حفظ مديولاكس® مديكي ؟
6. محتوى العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو مديولاكس® مديكي ولماذا يتم استخدامه؟

مديولاكس مديكي هو ملين من مجموعة ثلاثي فينيل ميثان.

للاستخدام فترة قصيرة في حالة الإمساك، في حالة الأمراض التي تتطلب تفرغ الأمعاء (التبرز).

2. مالذي ينبغي عليك مراعاته قبل تناول مديولاكس® مديكي ؟

يحظر تناول مديولاكس® مديكي

- إذا كان لديك حساسية ضد بيساكوديل أو أحد مكونات هذا الدواء الأخرى المذكورة في الفقرة 6 وكلك في حالات الإمساك أو لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

التحذيرات والإجراءات الوقائية

قبل تناول مديولاكس® مديكي يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي.

من اللازم الحرص بشكل خاص عند تناول الدواء في حالة الإمساك المصحوب بأعراض أخرى مثل آلام البطن والقيء والحمى، لأن هذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بمرض حاد (إسداد معوي، التهاب حاد في منطقة البطن). في حالة هذه الأعراض ينبغي عدم تناول مديولاكس® مديكي أو أدوية أخرى واستشارة الطبيب على الفور.
في حالة الأمراض التي يصحبها اضطرابات في معدل الماء أو الإلكتروليت يحظر استخدام مديولاكس® مديكي.

إرشاد:

في حالة الإمساك يجب أن يتم تناول المواد الملينة لفترة قصيرة. ينصح في العادة بالعلاج باستخدام مديولاكس® مديكي فقط، إذا لم يتحقق نجاح أو لم يتحقق النجاح بشكل كافي بعد تغيير التغذية (من خلال تناول المتزايد للألياف الغذائية وكمية كافية من السوائل) وكذلك من خلال تغيير أسلوب حياتك (من خلال الحركة الجسدية الكافية).

تناول مديولاكس® مديكي مع عقاقير دوائية أخرى:

إذا كنت تتناول أو تستخدم عقاقير دوائية أخرى، أو إذا كنت قد تناولت أو استخدمت عقاقير دوائية أخرى قبل فترة قصيرة أو كنت تعترزم أن تتناول أو تستخدم عقاقير دوائية أخرى يجب أن تخبر طبيبك أو الصيدلي.

مديولاكس مديكي يمكن أن يزيد من فقدان البوتاسيوم من خلال عقاقير دوائية أخرى (مثل ديورتيك).
الحساسية ضد الغليكوزيدات المؤثرة على القلب قد تزداد حدوثها بسبب فقدان البوتاسيوم.

تناول مديولاكس® مديكي مع المواد الغذائية والمشروبات

ينبغي تناول اللبن والمواد المعادلة للحموضة في المعدة (مضادات الحموضة) على الأقرب بعد نصف ساعة من استخدام مديولاكس® مديكي.

فترة الحمل والرضاعة

إذا كنت حاملاً أو تقومين بالإرضاع أو إذا كنتِ تعتقدين أنك حاملاً أو كنتِ تعترمين الحمل، فيجب الاستفسار قبل تناول هذا العقار الدوائي لدى طبيبك أو لدى الصيدلي. ليس هناك تقارير عن آثار غير مرغوب فيها في فترة الحمل والرضاعة. لم يتم إجراء دراسات مراقبة. يحظر تناول مديولاكس® مديكي في فترات الحمل بجرعات عالية ولفترات طويلة. يحظر استخدام مديولاكس® مديكي في فترة الرضاعة، لأنه ليس هناك معلومات كافية متوافرة عن احتمال انتقاله إلى لبن الأم.

القدرة على القيادة وتشغيل الماكينات

ليس من الضروري اتخاذ إجراءات احتياطية خاصة.

معلومات هامة عن مكونات خاصة في مديولاكس® مديكي

هذا الدواء يحتوي على سوربيتول. الرجاء تناول مديولاكس® مديكي بعد استشارة طبيبك فقط، إذا كان من المعروف لك، إنك تعاني من عدم تحمل أنواع محددة من السكريات.

3. كيف يتم تناول مديولاكس® مديكي؟

تناول هذا العقار الدوائي دائماً بدقة كما هو موصوف في النشرة أو تبعاً للاتفاق المتفق عليه مع طبيبك أو الصيدلي. قم بالاستعلام لدى طبيبك أو الصيدلي، إذا لم تكن متأكدًا تمامًا.

الجرعة المنصوح بها تبلغ

يتناول البالغين والأطفال التي تزيد أعمارهم عن 10 سنوات قرص واحد مديولاكس® مديكي المثلث لإفرازات المعدة (بما يطابق 10 ملغم بيساكوديل).

يتم تناول بدون مضغ، وعلى الأفضل في المساء أو الصباح صائماً مع كمية وفيرة من السائل. تناول في المساء يؤدي إلى تفرغ الأمعاء بعد حوالي 10 ساعات. تناول في الصباح صائماً يؤدي إلى تفرغ الأمعاء بعد حوالي 6 ساعات.

يجوز استخدام مديولاكس® مديكي بدون إرشادات طبية لفترة قصيرة فقط. في حالة الإمساك المزمن ينبغي استشارة الطبيب.

الرجاء مراجعة طبيبك أو الصيدلي، إذا كان لديك الإنبطاج، أن تأثير هذا الدواء شديد أو ضعيف.

إذا كنت قد تناولت كمية أكبر من المقرر من مديولاكس® مديكي

إن تناول كمية كبيرة من هذا الدواء يمكن أن يؤدي إلى إحداث إسهال. إذا كان لديك أعراض شديدة، يجب استشارة الطبيب.

إذا نسيت تناول مديولاكس® مديكي

لا تتناول جرعة مزدوجة، إذا كنت قد نسيت تناول الجرعة السابقة.

إذا توقفت عن تناول مديولاكس® مديكي

لا يوجد تأثير سلبي معروف لذلك.

إذا كان لديك استفسارات أخرى حول تناول هذا العقار الدوائي، فيرجى التوجه إلى طبيبك أو الصيدلي.

4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟

كما هو الحال في جميع العقاقير الدوائية قد يكون لهذا العقار الدوائي أعراض جانبية أيضاً، لكن قد لا تظهر هذه الأعراض عند كل شخص.

الأعراض الجانبية المحتملة:

من النادر ظهور أعراض جانبية في حالات تناول لفترة قصيرة.

نادراً (يمكن أن يصاب 1 من بين 1000 من الذين تم علاجهم بالدواء)

- بانتفاخات
- آلام في البطن
- ردود فعل حساسية

غالباً ما يؤدي تناول مديولاكس® مديكي لفترة طويلة إلى زيادة حدة كسل الأمعاء. لذلك ينبغي استخدام مديولاكس® مديكي لفترة قصيرة فقط. في حالة استخدام مديولاكس® مديكي بشكل مخالف (لفترة طويلة أو بجرعات عالية) فقد يحدث غالباً زيادة معدل فقدان الماء والبوتاسيوم وأملاح أخرى. هذا قد يؤدي إلى إضطرابات في وظائف القلب ولضعف العضلات، وعلى الأخص في حالة تناول أدوية مدرة للبول في نفس الوقت (مدر للبول) وهرمونات للغدة الكظرية (الغدد الكظرية).

الإخطار عن الأعراض الجانبية

إذا لاحظت أعراض جانبية، فيرجى التوجه إلى طبيبك أو الصيدلي. يسري هذا أيضاً على الأعراض الجانبية الغير مذكورة في نشرة العبوة هذه. كذلك تستطيع أيضاً أن تخبر المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية، قسم الصيدلة الاحتراسية، كورت - جيورج - كيسنجر إليه 3، 35175 بون / ألمانيا، صفحة الإنترنت: www.bfarm.de. في حالة الإخطار عن أعراض جانبية تستطيع أن تساهم في توفير معلومات أكثر عن سلامة هذا العقار الدوائي.

كيف يتم حفظ مديكي® مديكي ؟

.5

يُحفظ هذا العقار الدوائي بعيداً عن متناول الأطفال.

لا يجوز استخدام هذا العقار الدوائي بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على شريط الأقراص والعبوة الخارجية بعد "يستخدم حتى: ". تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى آخر يوم في الشهر المذكور.

ظروف الحفظ

لا يحفظ في درجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية.

لا تتخلص من العقار الدوائي في مياه الصرف أو القمامة المنزلية. استعلم لدى الصدلي الخاص بك كيف تتخلص من العقار الدوائي، إذا كنت لن تستخدمه بعد ذلك. بهذا تساهم في حماية البيئة.

محتوى العبوة ومعلومات أخرى

.6

ما هي مكونات مديكي® مديكي

المادة الفعالة هي بيساكوديل
قرص واحد مثببط لإفرازات المعدة يحتوي على 10 ملغم بيساكوديل

المكونات الأخرى هي: سليلوز دقيق البلورات، سوربيتول (السجل الأوربي للأدوية)، نشا كربوكسيل ميثيل - الصوديوم (طراز أ) (السجل الأوربي للأدوية)، ستيرات الماغنسيوم (السجل الأوربي للأدوية)، حمض الميثاكريليك - أكريلات الإيثيل - بوليمر مشترك (1:1) (السجل الأوربي للأدوية)، بوليسوربات 80، دوديسيل كيريتات الصوديوم، تالك، ماكروجول 6000، ثاني أكسيد التيتانيوم (E 171)، الحديد (III) - هيدروكسيد - أكسيد (E 172)، زرقة لامعة (E 133)، صوديوم - غير متبلور، هيدروكسيد الصوديوم

كيف يبدو مديكي® مديكي وما هو محتوى العبوة

أقراص مستديرة خضراء مثببطة لإفرازات المعدة

عبوة واحد تتضمن 50 قرصاً مثببط لإفرازات المعدة

شركة الأدوية والشركة المنتجة

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn, هاتف: 02371/937-0، الفاكس: 106-
www.medice.de، البريد الإلكتروني: info@medice.de

هذه النشرة تم مراجعتها مؤخراً في يوليو 2016