

قوبعلاب ققفرملا ةيناملأا قرشنلل ةيمسرلا ةمجرتلا تسيل هذه

مدختسملل تامولعم :مدختسال تامولعم

نويرو - ميديفيتان أقراص مغطاة بطبقة

المواد الفعالة: هيدروكلوريد الثيامين / هيدروكلوريد بيريدوكسين

للساخدام لدى الأشخاص البالغين.

قبل البدء في تناول هذا العقار الدوائي يرجى قراءة سائر النشرة المرفقة بالعبوة بعناية، لأنها تتضمن معلومات هامة.

تناول هذا العقار الدوائي دائماً بدقة كما هو موصوف في النشرة المرفقة أو تبعاً لتعليمات طبيبك أو الصيدلي المختص بك.

- الرجاء الاحتفاظ بنشرة العبوة. ربما ترغب في قراءتها مرة أخرى في وقت لاحق.
- قم بالاستفسار لدى الصيدلي، إذا كنت تحتاج إلى معلومات أخرى أو لنصيحة.
- إذا لاحظت أعراض جانبية، فيرجى التوجه إلى طبيبك أو الصيدلي. يسري هذا أيضاً على الأعراض الجانبية الغير مذكورة في نشرة العبوة هذه. أنظر فقرة 4.
- إذا لم تتحسن الأعراض أو أحسست بسوء حالتك يرجى التوجه إلى طبيبك.

ماذا يوجد في هذه النشرة

- 1؟مدختسال ةي عاود ةيه اموناتي فيديم - وريون وه ام
- 2 ؟ناتي فيديم - وريون لوانت لبقت اعارم لكي لع يغبني يذلام
- 3؟ناتي فيديم - وريون لوانت متي فيك
- 4؟ةلمت حمل ةي بن اجل ضارعالا يه ام
- 5؟ناتي فيديم - وريون ظفح متي فيك
- 6ىرخأ تامولعمو قوبعلال يوتحم

1 ما هو نويرو - ميديفيتان وما هي دواعي استخدامه؟

نويرو - ميديفيتان هو مستحضر فيتامين طبي

مواضع الاستخدام

أمراض الجهاز العصبي الناجمة عن النقص الثابت لفيتامين ب1 وفيتامين ب6.

2 مالذي ينبغي عليك مراعاته قبل تناول نويرو - ميديفيتان؟

يحظر تناول نويرو - ميديفيتان

- إذا كان لديك حساسية (أرجية) ضد هيدروكلوريد الثيامين أو هيدروكلوريد بيريدوكسين أو أحد المكونات الأخرى من نويرو-ميديفيتان المذكورة في الفصل 6.

التحذيرات والإجراءات الاحتياطية

قبل تناول نويرو - ميديفيتان يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي.

الأطفال

تناول نويرو - ميديفيتان مع عقاقير دوائية أخرى:

إذا كنت تتناول أو تستخدم عقاقير دوائية أخرى، أو إذا كنت قد تناولت أو استخدمت عقاقير دوائية أخرى قبل فترة قصيرة أو كنت تعزم أن تتناول أو تستخدم عقاقير دوائية أخرى يجب أن تخبر طبيبك أو الصيدلي.

الجرعات العلاجية من فيتامين ب6 يمكن أن تضعف من تأثير ليفودوبا. هناك تأثيرات متبادلة أخرى مع آيزونيازيد، د - بينسيلامين، سيكلوسيرين.

تناول نويرو - ميديفيتان مع المواد الغذائية والمشروبات

غير معروف حتى الآن تأثيرات متبادلة مع مواد غذائية أو مشروبات.

فترة الحمل والرضاعة

إذا كنت حامل أو ترضعين، فإن استخدام هذا الدواء يكون مفيداً فقط لعلاج النقص الثابت لفيتامين ب1 وفيتامين ب6 وذلك بسبب كمية المادة الفعالة به. لذلك يجوز لك استخدام نويرو - ميديفيتان فقط بعد تقدير دقيق للفوائد / المخاطر من خلال الطبيب المعالج. في فترة الحمل وفترة الرضاعة تبلغ الجرعة اليومية المنصوح بها من فيتامين ب1 كمية 1,4 - 1,6 ملغم ومن فيتامين ب6 كمية 2,4 - 2,6 ملغم. حتى الآن لم تثبت سلامة تناول جرعات أعلى من الجرعات اليومية المنصوح بها.

فيتامين ب1 وفيتامين ب6 ينتقلان إلى لبن الأم. الجرعات المرتفعة من فيتامين ب6 قد تؤدي إلى الحد من إنتاج اللبن.

القدرة على القيادة وتشغيل الماكينات

ليس من الضروري اتخاذ إجراءات احتياطية خاصة.

نويرو - ميديفيتان يحتوي على لاكتوز

الرجاء تناول نويرو - ميديفيتان بعد استشارة طبيبك فقط، إذا كان من المعروف لك، إنك تعاني من عدم تحمل أنواع محددة من السكريات.

3 كيف يتم تناول نويرو - ميديفيتان؟

تناول هذا العقار الدوائي دائماً بدقة كما هو موصوف في النشرة أو تبعاً للاتفاق المتفق عليه مع طبيبك أو الصيدلي. قم بالاستعلام لدى طبيبك أو الصيدلي، إذا لم تكن متأكداً تماماً.

الجرعة المنصوح بها تبلغ

يتم تناول نويرو - ميديفيتان بدون سكر مع بعض السوائل بعد الوجبات الغذائية.

بعد مرور 4 أسابيع على أقصى تقدير ينبغي على الطبيب المعالج أن يقرر، عما إذا كان من الواجب مواصلة تناول فيتامين ب6 وفيتامين ب1 بالتركيز العالي المذكور هنا. لكن إذا استدعى الأمر ينبغي تغيير المستحضر بمستحضر طبي يشتمل على المادة فعالة بنسبة أقل وذلك لخفض المخاطر العصبية المرتبطة بفيتامين ب6.

إذا كنت قد تناولت كمية أكبر من المقرر من نويرو - ميديفيتان

ينبغي تناول نويرو - ميديفيتان بالجرعة المنصوح بها فقط.

في حالة ظهور أعراض اضطرابات عصبية محيطية حسية (عدم الإحساس غالباً في الأيدي والأقدام) يجب مراجعة الجرعة وإيقاف تناول الدواء إذا استدعى الأمر (أنظر 4). الآثار الجانبية).

في حالة تناول جرعة مفرطة يرجى التوجه إلى الطبيب عند ظهور أعراض شكوى.

إذا نسيت تناول نويرو - ميديفيتان

لا تتناول جرعة مزدوجة، إذا كنت قد نسيت تناول الجرعة السابقة.

إذا أنقطعت عن تناول نويرو - ميديفيتان

إن نقص الفيتامين الذي لا يتم معالجته يمكن أن يؤدي إلى أضرار طبية.

إذا كان لديك استفسارات أخرى عن استخدام هذا الدواء، يرجى التوجه إلى طبيبك أو الصيدلي المختص بك.

4 ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟

كما هو الحال في جميع العقاقير الدوائية قد يكون لهذا العقار الدوائي أعراض جانبية أيضاً، لكن قد لا تظهر هذه الأعراض عند كل شخص.

في حالة تقييم الأعراض الجانبية تم ذلك على أساس بيانات التكرار التالية:

- غالباً جداً: أكثر من 1 من بين 10 تم علاجهم
- غالباً: 1 حتى 10 تم علاجهم من بين 100
- أحياناً: 1 حتى 10 تم علاجهم من بين 1,000
- نادر: 1 حتى 10 تم علاجهم من بين 10,000
- نادر جداً: أقل من 1 من بين 10000 تم علاجهم
- غير معروف: لا يمكن تقدير التكرار على أساس البيانات المتوافرة.

الأعراض الجانبية المحتملة

نادراً جداً ما تم الإبصار عن نوبات عرق وتسرع القلب (إسراع في ضربات القلب) وردود فعل جلدية مع حكة والشرى.

في حالة تناول فيتامين ب6 بجرعات عالية لفترة طويلة (أطول من شهرين بجرعة تفوق 1 غم/يومياً) قد تظهر آثار مضرّة للأعصاب.

في حالة تناول فيتامين ب6 لفترة طويل (أطول من 6 - 12 شهراً) بجرعة يومية تفوق 50 ملغم فقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات عصبية حسية (عدم إحساس غالباً في الأيدي والأقدام).

في الحالات النادرة جداً للغاية في حالة الصدمات الحساسية يجب القيام بإجراءات الطوارئ الضرورية. في الحالات الأخرى التي يلزمها ردود فعل عدم تحمل خفيف يكفي إيقاف تناول نويرو - ميديفيتان.

الأخطار عن الأعراض الجانبية

إذا لاحظت أعراض جانبية، فيرجى التوجه إلى طبيبك أو الصيدلي. يسري هذا أيضاً على الأعراض الجانبية الغير مذكورة في نشرة العبوة هذه. تستطيع أيضاً الإبلاغ عن الأعراض الجانبية مباشرة عن طريق استمارة الإخطار الخاصة بالأعراض الجانبية الغير مرغوب فيها للعقاقير الدوائية (<http://www.bfarm.de>). (UAW) في حالة الإبلاغ عن أعراض جانبية تستطيع أن تساهم في توفير معلومات أكثر عن أمن هذا العقار الدوائي.

5 كيف يتم حفظ نويرو - ميديفيتان؟

يحفظ هذا العقار الدوائي بعيداً عن متناول الأطفال.

لا يجوز استخدام هذا العقار الدوائي بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على شريط الدواء والغلاف الخارجي بعد عبارة "صالح للاستخدام حتى:". تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى آخر يوم في الشهر المذكور.

ظروف الحفظ

يحظر حفظه في درجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية.

لا تتخلص من العقار الدوائي في مياه الصرف أو القمامة المنزلية. استعلم لدى الصيدلي الخاص بك كيف تتخلص من العقار الدوائي، إذا كنت لن تستخدمه بعد ذلك. بهذا تساهم في حماية البيئة.

6 محتوى العبوة ومعلومات أخرى

ما هي المواد التي يحتوي عليها نويرو - ميديفيتان:

• المواد الفعالة هي:

قرص واحد يتضمن:

هيدروكلوريد الثيامين (فيتامين ب1) 100

ملغم

هيدروكلوريد بيريدوكسين (فيتامين ب6) 100

ملغم

• المكونات الأخرى هي:

خبيدرات اللاكتوز الاحادية، بوفيدون ك30، كروسبوفيدون، بولي إيثلين جليكول 6000، سترات
الماغنسيوم، بولي (فينيل الكحول)، بولي إيثلين جليكول 4000، تلك، ثاني أكسيد التيتان، أكسيد
الحديد الثلاثي، ثاني وثالث أكسيد الحديد، هيدروكسيد الحديد الثلاثي $x H_2O$

كيف يبدو نويرو - ميديفيتان وما هو محتوى العبوة

أقراص دائرية بنية اللون مغطاة بطبقة

عبوة شرائط بها 50 و 100 قرص.

شركة الأدوية والشركة المنتجة

شركة MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37

D-58638 Iserlohn

الهاتف: 0- 937 02371

الفاكس: 329- 937 02371

www.medice.de

e-mail: info@medice.de

هذه النشرة تم مراجعتها مؤخراً في أكتوبر 2013