

بالعبوة المرفقة الألمانية، يرجى الرجوع إلى ترجمات ليست هذه

معلومات الاستخدام: معلومات للمستخدم

ميلابون ك 250 ملغم / 250 ملغم / 50 ملغم أقراص

حامض أسيتيل ساليسيليك
باراسيتامول
كوفايين

للاستخدام لدى البالغين والأطفال ابتداء من عمر 12 سنة، إذا لم تؤثر الإجراءات الأخرى.



- قبل البدء في تناول هذا العقار يرجى قراءة سائر النشرة المرفقة بالعبوة بعناية، لأنها تتضمن معلومات هامة. تناول هذا العقار الدوائي دائماً بدقة كما هو موصوف في النشرة أو تبعاً لتعليمات الطبيب أو الصيدلي.
- الرجاء الاحتفاظ بنشرة العبوة. ربما ترغب في قراءتها مرة أخرى في وقت لاحق.
 - قم بالاستفسار لدى الصيدلي المختص بك، إذا كنت تحتاج إلى معلومات أخرى أو لنصيحة.
 - إذا لاحظت أعراض جانبية، فيرجى التوجه إلى طبيبك أو الصيدلي المختص بك. يسري هذا أيضاً على الأعراض الجانبية الغير مذكورة في نشرة العبوة هذه. أنظر فقرة 4.
 - إذا لم تتحسن الأعراض الجانبية بعد 4 أيام أو أحسست بسوء حالتك يرجى التوجه إلى طبيبك.

ماذا يوجد في هذه النشرة

1. ما هو ميلابون ك ولماذا يتم استخدامه؟
2. مالذي ينبغي عليك مراعاته قبل تناول ميلابون ك؟
3. كيف يتم تناول ميلابون ك؟
4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟
5. كيف يتم حفظ ميلابون ك؟
6. محتوى العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو ميلابون ك ولماذا يتم استخدامه؟

ميلابون ك هو دواء مخفف للألام وخافض للحرارة ومهدئ للالتهابات (مضاد للالتهابات اللاسترويدية / مسكن للألم - هو مزيج من حامض أسيتيل ساليسيليك والبراسيتامول والكوفايين).

يستخدم ميلابون ك في حالة الألام الخفيفة حتى الألام الشديدة المحتملة.

الرجاء مراعاة البيانات الخاصة بالأطفال والفتيان (أنظر الفقرة 2)

إذا لم تتحسن الأعراض الجانبية بعد 4 أيام أو أحسست بسوء حالتك يرجى التوجه إلى طبيبك.

2. مالذي ينبغي عليك مراعاته قبل تناول ميلابون ك؟

يحظر تناول ميلابون ك

- إذا كان لديك حساسية ضد حامض أسيتيل ساليسيليك وباراسيتامول والكوفايين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفصل 6.
- إذا كان قد حدث لديك رد فعل في الماضي على حامض ساليسيليك أو مضادات الالتهابات اللاسترويدية (عقاقير محددة ضد الألام والحرارة أو الالتهابات) من خلال نوبات أزمة أو بأي شكل آخر حساس؛
- في حالات نزيف المعدة والأمعاء أو الإنتناب (ثقب) في التاريخ المرضي السابق فيما يتعلق بعلاج سابق بمضادات روماتيزم لاسترويدية / مسكنات ألام (NSARs)؛
- في حالة تكرار ظهور حالي أو في الماضي لأورام في المعدة والأثنى عشر (قرحة هضمية) أو نزيف على الأقل بنوبتين يرجع إلى أورام ثبت وجودها أو نزيف؛
- في الميل المرضي الشديد للنزيف؛
- في حالة الفشل الكيدي والكليوي؛
- في حالة الضعف الحاد لعضلة القلب (قصور قلبي شديد)؛
- إذا كنت تتناول في نفس الوقت 15 ملغم أو أكثر في الأسبوع من ميثوتركسيت؛
- في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل؛
- الأطفال الذين تبلغ أعمارهم أقل من 12 سنة.

حامض أسيتيل ساليسيليك هو أحد المواد الفعالة من ميلابون ك وهي تنتمي إلى مجموعة الأدوية (المضادة للالتهابات اللاسترويدية)، التي قد تؤثر على خصوبة السيدات. هذا التأثير يعود مرة أخرى بعد التوقف عن تناول الدواء (قابل للانعكاس)

التحذيرات والإجراءات الاحتياطية

يرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي المختص بك قبل تناول ميلابون ك .

من الضروري إجراء مراقبة طبية دقيقة:

- في حالة الحساسية ضد مضادات الالتهاب الأخرى / مسكنات الألام (أدوية معينة ضد الروماتيزم أو الالتهابات) أو أي مواد أخرى مسببة للحساسية؛
- في حالة وجود حساسية (على سبيل المثال برودود فعل جلدية، حكة، حمى الشرى) أو أزمة أو الالتهاب الأنفي الأرجي، تور الأغشية المخاطية بالأنف (السلانل الأنفية)، أمراض المسالك الهوائية المزمنة؛
- في حالة القصور في وظائف الكبد أو الكلى؛
- في حالة ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب (احتشاء القلب)؛
- قبل العمليات الجراحية (أيضاً في حالة العمليات الصغيرة، مثل خلع أحد الأسنان)؛ حيث قد يحدث ميل إلى النزف بشدة. الرجاء إخطار طبيبك أو طبيب الأسنان، إذا كنت قد تناولت ميلابون ك.
- في حالة القصور في وظائف الكبد (التهاب الكبد، متلازمة غلبرت)؛
- في حالة أمراض الكحول المزمنة؛
- في حالة نشاط الغدد الدرقية؛
- في حالة اضطرابات ضربات القلب؛
- في اضطرابات الخوف.

تأثيرات على الجهاز الهضمي

يجب تجنب استخدام حامض أسيتيل ساليسيليك في نفس الوقت مع مضادات الالتهابات اللاسترويدية بما فيها ما يسمى مثبطات كوكس-2 (مثبطات سيكلووكسيجيناز-2) التي تستخدم من بين ذلك ضد أعراض الشكوى الروماتيزمية. في حالة المرضى المسنين تظهر أعراض جانبية بشكل متزايد بعد استخدام مضادات الالتهابات اللاسترويدية خاصة النزيف في منطقة المعدة والأمعاء التي قد تكون مهددة للحياة.

لقد تم الإبصار عن النزيف وتكون الأورام والبطن الحاد (ثقوب) في منطقة المعدة والأمعاء التي قد تؤدي إلى الوفاة بشكل يتعلق بتناول جميع مضادات

الالتهابات اللاستروبيدية.

وقد ظهرت بأعراض تحذيرية مسبقة أو بدون أو أحداث حادة في الجهاز الهضمي في التاريخ المرضى السابق في أي وقت من العلاج. وقد إزداد الخطر لذلك مع زيادة جرعة مضادات الالتهابات اللاستروبيدية لدى المرضى الذين أصيبوا بأورام في التاريخ المرضى السابق، وعلى الأخص مع مضاعفات النزيف أو البطن الحاد ولدى المرضى المسنين. يجب على هؤلاء المرضى البدء في العلاج بأقل جرعة متوافرة. هنا ينبغي أخذ علاج للمضاعفات بدواء وافي للأغشية المخاطية للمعدة (على سبيل المثال ميسوبروستول أو مثبط مضخة البروتون) في عين الاعتبار. وينصح بهذا أيضاً للمرضى الذين يتناولون أدوية أخرى ترفع من خطر الإصابة بمرض في الجهاز الهضمي (أنظر فقرة 2 أسفله: تناول ميلابون ك مع عقاقير دوائية أخرى").

المرضى وخاصة المتقدمين في العمر منهم الذين ظهر لديهم في السابق أعراض جانبية في الجهاز الهضمي، ينبغي عليهم الإخطار بجميع الأعراض الغير عادية في حوض البطن، وعلى الأخص عند بداية العلاج. من الضروري الحرص لدى المرضى الذين يتناولون في نفس الوقت عقاقير دوائية ترفع من خطر الإصابة بتكوين أورام أو نزيف، على سبيل المثال كورتيكويد، الأدوية المثبطة لتجلط الدم مثل فارفارين مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، التي يتم تقريرها لعلاج الإكتئاب أو مضادات الصفائح (أنظر فقرة 2 أسفله: تناول ميلابون ك مع عقاقير دوائية أخرى").

يجب إيقاف العلاج، إذا حدث نزيف أو تكون ورم في الجهاز الهضمي.

تعليمات أخرى

يمكن خفض الأعراض الجانبية، إذا تم استخدام أقل جرعة لأقصر فترة من أجل مراقبة الأعراض في الفترة اللازمة.

في حالة تناول الدائم لمسكنات الألم قد يحدث الصداع الذي قد يؤدي إلى التناول مرة أخرى وقد يؤدي هذا من جهة أخرى إلى استمرار الصداع.

إن تناول المعتاد لمسكنات الألم يمكن أن يؤدي إلى أضرار دائمة بالكلية تصل إلى خطر الفشل الكلوي (اعتلال الكلية بالمسكنات). هذا الخطر يكون كبير على الأخص، إذا تناولت عدة مسكنات مختلفة للألم مختلطة مع بعضها البعض.

حامض أسيتيل ساليسيليك يقلل في الجرعة المنخفضة التخلص من الحامض البولي. في حالة المرضى الذين يميلون إلى التخلص المنخفض من الحامض البولي يمكن أن يؤدي هذا في بعض الظروف إلى التسبب في حالة نقرس.

الأطفال والفتية

في حالة الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 سنة المصابون بأمراض يصاحبها حمى ينبغي استخدام ميلابون ك بناء على تعليمات الطبيب فقط ويستخدم فقط، إذا لم تؤثر الإجراءات الأخرى. إذا وصل الأمر في هذه الأمراض إلى قى مستمر لفترة طويلة، فقد يكون هذا علامة على منلازمة راي وهي مرض نادر، لكنه مرض مهدد للحياة، يحتاج على الضرورة إلى معالجة طبية على الفور.

تناول ميلابون ك مع عقاقير دوائية أخرى

إذا كنت تتناول عقاقير دوائية أخرى، يجب أن تخبر طبيبك أو الصيدلي، بأنك تناولت قبل فترة قصيرة عقار دوائي آخر أو لديك النية لتناول عقار دوائي آخر.

من الممكن أن يتأثر تأثير العقاقير الدوائية أو المجموعات الدوائية المذكورة فيما بعد في حالة العلاج في نفس الوقت بميلابون ك.

حامض أسيتيل ساليسيليك يزيد من تأثير: (من جراء ذلك يرتفع خطر الأعراض الجانبية)

- الأدوية المثبطة لتجلط الدم، على سبيل المثال كومارين وفارفارين وهيبارين.
- مثبطات الصفائح (الأدوية التي تخفض من التصاق وتكتل الصفائح الدموية)، على سبيل المثال تيسلوبيدين وكلوبوجريل ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (أدوية لعلاج الاكتئاب) ترفع من خطر الإصابة بنزيف وتكون أورام في الجهاز الهضمي.
- الهرمونات القشرية السكرية (أدوية تحتوي على كورتيزون أو مركبات شبيهة بالكورتيزون) أو مضادات الالتهابات اللاستروبيدية الأخرى / مسكنات الألم (أدوية مهدنة للالتهابات ومسكنة للألم) تزيد من خط أورام الجهاز الهضمي ونزيف الجهاز الهضمي.
- ديجوكسين (دواء لتقوية القلب).
- خافضات سكر الدم (أدوية تخفض من سكر الدم): قد ينخفض معدل السكر في الدم.
- ميتوتريكسات (دواء لعلاج أمراض السرطان أو أمراض معينة من الروماتيزم).
- حامض الفالبرويك (دواء لعلاج حالات التشنج).

حامض أسيتيل ساليسيليك يقلل من تأثير:

- مدرات البول (أدوية لزيادة التبول) في حالة تناول جرعات من ميلابون ك ابتداء من 3 غم حامض اسيتيل ساليسيليك (ما يعادل 12 قرص) وأكثر كل يوم.
- مثبط الأنزيم المحول للأنجيوتنسين (أدوية معينة لخفض ضغط الدم) في حالة تناول جرعات من ميلابون ك ابتداء من 3 غم حامض اسيتيل ساليسيليك (ما يعادل 12 قرصاً) وأكثر كل يوم.
- أوية النقرس المدرة للبول (على سبيل المثال بروبنيسيد، بينزبرومارون).

الكوفايين:

- يقلل من التأثير المنشط للنوم لمركبات مثل باربيتوراتن (أدوية منومة معينة)، مضادات الهيستامين (أدوية معينة ضد الحساسية) إلخ.
- يرفع من التأثير الزائد لنبضات القلب لمركبات مثل المحاكي الودي (أدوية معينة للدورة الدموية)، تيروكسين (أدوية معينة للغدد الدرقية) إلخ.
- قد يرفع من تأثير باراسيتامول وبعض مضادات الالتهابات اللاسترويدية (أدوية معينة مسكنة للألام).
- يقلل من التخلص من ثيوفيلين (دواء معين لعلاج أمراض الرئة).
- يزيد من إمكانية إدمان مركبات من نوع إفيدرين.
- وسائل منع الحمل الفموية (وسائل منع الحمل)، سيميبيدين (دواء معين لعلاج أورام المعدة) وديسولفيرام (دواء معين ضد إدمان الكحول) يقلل من التخلص من الكوفايين في الكبد. باربيتوراتا (أدوية منومة معينة) والتدخين يزيدون منه.
- المضادات الحيوية من نوع حامض كربونات الكوينولون (أدوية معينة لعلاج العدوى) يمكن أن تؤخر من التخلص من الكوفايين والمنتجات التي تتخلص منه باراكسانتين.

باراسيتامول:

- من الممكن حدوث تأثيرات تفاعلية مع
- أدوية النقرس مثل بروبيبيسيد: في حالة تناول بروبيبيسيد في نفس الوقت ينبغي خفض جرعة ميلابون ك، لأنه التخلص من ميلابون ك قد يتم ببطأ.
 - المنومات مثل فينوباريتال
 - الأدوية المضادة للتشنجات مثل فينيتوين وكارباماتسبين
 - الأدوية المضادة للدرن (ريفامبيسين)
 - الأدوية الأخرى التي يمكن أن تتضرر بالكبد
- في بعض الظروف قد تحدث أضرار للكبد في حالة تناول في نفس الوقت مع ميلابون ك.
- أدوية ضي العثيان (بتوكولوبراميد ودومبيربون): قد تسرع هذه من امتصاص وظهور تأثير ميلابون ك.
 - أدوية لخفض مستوى الدهون في الدم (خافضة للكوليسترول): يمكن أن يخفض هذه من امتصاص ميلابون ك وبالتالي من تأثيره.
 - المواد التي تبطئ من تفريغ المعدة: قد يتأخر الامتصاص وحدث التأثير.
 - أدوية لحالات الإصابة بفيروس العوز المناعي (زيدوفودين): يزداد الميل إلى خفض الكرات الدموية البيضاء (قلة الخلايا المتعادلة). لذلك يجب تناول ميلابون ك في نفس الوقت مع زيدوفودين بعد تقرير الطبيب فقط.

تأثير تناول ميلابون ك على الفحوص المعملية

قد تتأثر نتائج تحديد الحامض البولي وكذلك السكر في الدم.

تناول ميلابون ك مع الكحول

ينبغي عليك في حالة استخدام ميلابون ك تجنب تناول الكحول بقدر الإمكان، لأن تناول الكحول قد يرفع من خطر حدوث أورام في الجهاز الهضمي.

الحمل والرضاعة والقدرة على الإخصاب

إذا كنت حاملاً أو تقومين بالإرضاع أو إذا كنت تعتقدين أنك حاملاً أو كنت تنوي على الحمل، فيجب الاستفسار قبل تناول هذا العقار الدوائي لدى طبيبك أو لدى الصيدلي.

الحمل

لا يجوز لك تناول ميلابون ك في الثلث الأول والثاني من الحمل إلا بعد مراجعة طبيبك فقط. في الأشهر الثلاثة الأخيرة للحمل لا يجوز تناول ميلابون ك بسبب الخطر المرتفع للمضاعفات التي تنجم للأم والجنين.

فترة الرضاعة

المواد الفعالة حامض أسيتيل ساليسيليك وباراسيتامول وكوفايين تنتقل إلى لبن الأم. في حالة الاستخدام لفترة قصيرة أو الجرعة المنخفضة لا يستلزم ذلك في العادة إيقاف الرضاعة. من الجائز أن يحدث ضرر لصحة وسلوك الرضيع من خلال الكوفايين الممتص في لبن الأم. في حال الاستخدام لفترة طويلة أو تناول جرعات عالية يجب في هذه الحالة فطام الطفل.

القدرة على الإنجاب حامض أسيتيل ساليسيليك هو أحد المواد الفعالة من ميلابون ك التي تنتمي إلى مجموعة الأدوية (المضادة للالتهابات اللاسترويدية)، التي قد تضر بخصوبة السيدات. هذا التأثير يعود مرة أخرى بعد التوقف عن تناول الدواء (قابل للانعكاس)

القدرة على القيادة وتشغيل الماكينات

ليس من الضروري اتخاذ إجراءات احتياطية خاصة.

3. كيف يتم تناول ميلابون ك؟

تناول هذا العقار الدوائي دائماً بدقة كما هو موصوف في النشرة أو تبعاً للاتفاق المتفق عليه مع طبيبك أو الصيدلي. قم بالاستعلام لدى طبيبك أو الصيدلي المختص بك، إذا لم تكن متأكد تماماً.

الجرعة المنصوح بها تبلغ

العمر	جرعة فردية	إجمالي الجرعة اليومية
البالغين والأطفال ابتداءً من 12 عام	1 - 2 قرص (تعادل ما بين 250 - 500 ملغم من حامض أيتيل ساليسيليك ، 250 - 500 ملغم باراسيتامول و 50 - 100 ملغم كوفايين)	حتى 6 أقراص (تعادل ما بين 1500 ملغم من حامض أيتيل ساليسيليك، 1500 ملغم باراسيتامول و 300 ملغم كوفايين)

يمكن تناول الجرعات الفردية، إذا كان من الضروري، على فترات متباعدة من 4 - 8 ساعات وحتى 3 مرات يومياً.

الرجاء تناول الأقراص مع كمية وفيرة من السوائل (على سبيل المثال مع كوب من الماء).
يحظ تناول المعدة فارغة.

الخط الفاصل على القرص الهدف منه تقسيم القرص، إذا كان لديك صعوبة في ابتلاع القرص كاملاً.

إذا كنت قد تناولت كمية أكبر من المقرر من ميلابون ك

لمنع خطر التناول بجرعة مفرصة، ينبغي عليك التأكد، أن الأدوية الأخرى التي يتم تناولها في نفس الوقت لا تحتوي على باراسيتامول.
يجب أن لا تتعدى الجرعة الإجمالية للباراسيتامول للبالغين 4 غم يومياً أي (ما يعادل 4000 ملغم باراسيتامول).
في حالة التناول بجرعة مفرصة تظهر خلال 24 ساعة أعراض الشكوى التي تتضمن الغثيان والقئ وفقدان الشهية وشحوب في الوجه وآلام في البطن.
أيضاً الدوار والصفير في الأذن يمكن أن يكونا علامات تسمم جاد لدى الأطفال والمرضى المسنين. علامات أخرى يمكن أن تكون شكوى قلبية ونبض سريع.

إذا كان هناك شك، أنه قد تم تناول ميلابون ك بكمية أكبر مما هو مقرر، يجب عليك الاتصال بأقرب طبيب لطب المساعدة!
هذا يمكن له أن يقرر الإجراءات اللازمة إذا استدعى الأمر وذلك تبعاً لحدة الجرعة المفرطة / حدة التسمم.

إذا نسيت تناول ميلابون ك

لا تتناول كمية مزدوجة، إذا كنت قد نسيت تناول الجرعة السابقة.

إذا كان لديك استفسارات أخرى حول تناول هذا العقار الدوائي، فيرجى التوجه إلى طبيبك أو الصيدلي.

4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟

كما هو الحال في جميع العقاقير الدوائية قد يكون لهذا العقار الدوائي أعراض جانبية أيضاً، لكن قد لا تظهر هذه الأعراض عند كل شخص.

إن ذكر الآثار الغير مرغوب فيها التالية يتضمن جميع الأعراض الجانبية المعروفة مع العلاج بحامض اسيتيل ساليسيليك والباراسيتامول وكذلك الكوفايين،
أيضاً مثل هذه المركبات التي تم تناولها في علاج طويل المدى بجرعات عالية.

في حالة تقييم الأعراض الجانبية تم ذلك على أساس بيانات التكرار التالية:

غالباً جداً:	أكثر من 1 من بين 10 مُعالجون
غالباً:	1 حتى 10 مُعالجون من بين 100
أحياناً:	1 حتى 10 مُعالجون من بين 1,000
نادر:	1 حتى 10 مُعالجون من بين 10,000
نادراً جداً	أقل من 1 من بين 10,000 مُعالجون
غير معروف:	لا يمكن تقدير التكرار على أساس البيانات المتوفرة.

أمراض الدم والجهاز الليمفاوي

النزيف مثل نزيف الأنف أو نزيف الأسنان أو نزيف الجلد مع إمكانية طول فترة النزيف. وقد يستمر هذا التأثير لمدة 4 - 8 أيام بعد التناول.
وقد تم الإبصار بشكل نادر وحتى نادراً للغاية عن حدوث نزيف حاد مثل نزيف المخ، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم لم يتم ضبطه و/أو العلاج في نفس الوقت بمضادات التجلط (أدوية مثبطة لتجلط الدم)، الأمر الذي قد يكون في حالات منفردة مهدد للحياة.
نادراً جداً

الإقلال من عدد الصفائح الدموية أو الكرات البيضاء (قلة الصفائح، ندرة المحببات).

أمراض الجهاز المناعي

أحياناً:

ردود فعل حساسية، مثل ردود فعل جلدية.

نادر:

ردود فعل حساسية (مثل إحمرار الجلد، أو ديماء، العرق الشديد حتى الأرتكاريا) وربما بهبوط ضغط الدم وحالات ضيق في التنفس وصدمات أرجية وتورمات في الوجه واللسان والحنجرة (أوديما - كوينكا) خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الأزمة.

أمراض الجهاز العصبي

الأرق، القلق، الصداع، الدوار، اضطرابات في القدرة على السمع. صفير في الأذن (التيتانوس) والتوهان العقلي يمكننا أن يكونا علامات على فرط الجرعة.

أمراض القلب والدورة الدموية

ضربات القلب السريعة (سرعة النبض)

أمراض الجهاز الهضمي

غالباً:

أعراض شكاوى في الجهاز الهضمي مثل حرقة الفؤاد والغثيان والقئ وألام البطن

نادر:

نزيف في المعدة والأمعاء التي يمكن أن تؤدي نادراً إلى نقص في الحديد الأنيميا. أورام في الجهاز الهضمي، في بعض الظروف مع نزيف وبطن حاد. هذه الأعراض الجانبية تظهر على الأخص لدى المرضى المسنين. إذا ظهرت آلام شديدة في منطقة فوق المعدة وقئ دم ودم في البراز أو تلون البراز باللون الأسود، يجب عليك إيقاف تناول ميلابون ك وإخطار الطبيب على الفور.

أمراض الكبد والمرارة

نادر:

تم ملاحظة ارتفاع في قيم الكبد.

أمراض الجلد والأنسجة التي أسفل الجلد

نادر جداً

ردود فعل جلدية حادة مثل الطفح الجلدي مع الأحمار وتكون فقاعات (مثل حمامي عديدة الأشكال).

إذا لاحظت لديك الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه، يجب عدم تناول ميلابون ك مرة أخرى. قم بإخطار طبيبك، لكي يمكنه تقرير حدة الأعراض وإتخاذ الإجراءات اللازمة، إذا استدعى الأمر ذلك.

الإخطار عن الأعراض الجانبية

إذا لاحظت أعراض جانبية، فيرجى التوجه إلى طبيبك أو الصيدلي المختص بك. يسري هذا أيضاً على الأعراض الجانبية الغير مذكورة في نشرة العبوة هذه.

من الممكن أيضاً أن تبلغ مباشرة عن أعراض جانبية (أنظر التفاصيل فيما يلي). في حالة الإخطار عن أعراض جانبية تستطيع أن تساهم في توفير معلومات أكثر عن سلامة هذا العقار الدوائي.

ألمانيا

المعهد الاتحادي للدواء والمنتجات الطبية

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3

53175 بون / ألمانيا

صفحة الإنترنت: <http://www.bfarm.de>

لوكسمبورغ / لوكسمبورغ:

Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments

Villa Louvigny – Allée Marconi

L-2120 Luxembourg

Site internet: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

5. كيف يتم حفظ ميلابون ك؟

لا يحفظ في درجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية.

يحفظ هذا العقار الدوائي بعيداً عن متناول الأطفال.

لا يجوز استخدام هذا العقار الدوائي بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على الكرتون الخارجية والعبوة بعد "يستخدم حتى:" تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى آخر يوم في الشهر المذكور.

لا تتخلص من العقار الدوائي في مياه الصرف أو القمامة المنزلية. استعلم لدى الصيدلي الخاص بك كيف تتخلص من العقار الدوائي، إذا كنت لن تستخدمه بعد ذلك. بهذا تساهم في حماية البيئة.

6. محتوى العبوة ومعلومات أخرى

مكونات ميلابون ك

المواد الفعالة هي: حامض اسيتيل ساليسيليك وباراسيتامول وكوفايين

كل قرص يحتوي على 250 ملغم اسيتيل ساليسيليك و250 غم باراسيتامول و50 ملغم كوفايين

المكونات الأخرى هي:

سيليلوز دقيقة دقيقة البلورات، تالك، نشا ذرة، هيدروكسيد بروبييل ميثيل سيللوز: ثاني أكسيد السليكون عالي التشتيت؛ ثنائي ميثيل السيلوكوزان؛ ميثيل السيليلوز؛ حمض السوربيك (الدستور الأوربي للأدوية)

كيف يبدو ميلابون ك وما هو محتوى العبوة

أقراص بيضاء مستديرة أحد الأزرجه عليه علامة تقسيم وعلى الوجه الآخر تم طبع "m".

ميلابون ك متوافر في عبوات بها 20 قرصاً.

الشركة صاحبة الترخيص

MEDICE Pharma GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn , هاتف: 152790 (02371)

فاكس: 937-329 (02371), البريد الإلكتروني: info@medice-pharma.de, www.medice.de

شركة الأدوية والشركة المنتجة

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn , هاتف: 0-02371/937, الفاكس: 106-

937 (02371), البريد الإلكتروني: info@medice.de, www.medice.de



هذه النشرة تم مراجعتها مؤخراً في نوفمبر 2015